

6 september 2016

RCZP

1. Opening en mededelingen

Dit is de laatste vergadering voor Henk-Jan en Danusia. Namens health Base willen we ze bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.

2. Protocol "pil vergeten"

Levonorgestrel

Omdat Sint-Janskruid als handverkoop verkocht kan worden en een interactie heeft met levonorgestrel. Wordt in de "anticonceptie vergeten" protocollen gevraagd of "Sint-Janskruid" gebruikt wordt. Het advies voor deze interactie is gewijzigd:

Voor de morning-afterpil met 1,5 mg levonorgestrel is het advies om binnen 5 dagen na onbeschermdde gemeenschap of bij vermoeden van anticonceptie-falen een morning-after koperspiraaltje te laten plaatsen door een arts. Wanneer de vrouw dit niet wil of kan, dan is het advies om een dubbele dosis levonorgestrel (3 mg) in één keer in te nemen. Voor ulipristal is het advies om een morning-after koperspiraaltje te plaatsen omdat gelijktijdig gebruik met enzyminductoren wordt afgeraden.

Vraag van Health Base aan de commissie:

In de protocollen wordt Pharmacom en Medicom wordt dit nu weergegeven met een aanvulling in de helptekst. Is dit voldoende duidelijk zo?

"Let op! Interactie met sint janskruid adviseer spiraaltje".

Antwoord RCZP:

Ja dit is goede en juiste toevoeging.

Ulipristal

In 'huisarts en wetenschap' wordt weergegeven dat Ulipristal op de reservebank staat. KNMP zegt wat anders zie bijlagen.

Vraag van Health Base aan de commissie :

Welke richtlijn gaan we volgen? We volgen voor de protocollen zowel het NHG als KNMP.

Antwoord RCZP:

Voorstel voor nieuwe tekst is:

Oude tekst:

De werking van de morning-afterpil (levonorgestrel) kan op basis van theoretische gronden verminderd zijn door het gebruik van sint janskruid. Zie voor meer informatie IA 003 van het CM.

Verwijs door naar de arts voor eventueel plaatsen van spiraaltje.

Waarna het desgewenst langer kan blijven zitten (tot 5 jaar).

Nieuwe tekst

Ulipristal (tot 5 dagen)

De werking van de morning-after-pil kan op basis van theoretische gronden verminderd zijn door het gebruik van sint janskruid. Zie voor meer informatie IA 471 van het CM.

Verwijs door naar de arts voor eventueel plaatsen van spiraaltje.

Waarna het desgewenst langer kan blijven zitten (tot 5 jaar).

Levonorgestrel (tot 3 dagen)

De werking van de morning-after-pil (levonorgestrel) kan op basis van theoretische gronden verminderd zijn door het gebruik van sint janskruid. Zie voor meer informatie IA 471 van het CM.

Verwijs door naar de arts voor eventueel plaatsen van spiraaltje.

Waarna het desgewenst langer kan blijven zitten (tot 5 jaar).

Mocht de patiënte bezwaren hebben tegen een spiraaltje adviseer dan om 2 tabletten levonorgestrel in te nemen.

3. Samenwerkingsprotocollen

Loes heeft een inhalatiesamenwerkingprotocol opgesteld.

De samenwerkingsprotocollenmodule is technisch niet gewijzigd.

Inhoudelijk is het samenwerkingsprotocol aangepast zodat het duidelijk en eenvoudig zichtbaar is of er een inhalatieprotocol is ingevuld.

Bij het openen van het protocol is meteen zichtbaar of de andere zorgverlener de instructie gegeven heeft bij de patiënt.

De sub-protocollen in het samenwerkingsprotocol zijn de inhalatieprotocollen die nu gehanteerd worden in Medicom/Pharmacom (volgens de LAN (Long Alliance Nederland)).

Wanneer wordt gestopt met de pilot blijven de ingevulde gegevens in de samenwerkingsprotocollenmodule bewaard en kunnen ze teruggevonden worden in de normale protocollen.

Geïnteresseerde commissieleden het samenwerkingsprotocol kunnen contact met Loes opnemen.

4. Vergaderdata voorstel 2017

RCZP (Pharmacom)

- 24 januari (19.30uur gezamenlijk)
- 11 april (18.00uur)
- 20 juni (18.00uur)
- 12 sept (19.30uur gezamenlijk)
- 21 nov (18.00uur)

RCZP (Medicom) (18.00uur)

- 24 januari (gezamenlijk)
- 18 april
- 27 juni
- 12 sept (gezamenlijk)
- 28 november

Iedereen gaat akkoord met de nieuwe datavoorstel voor 2017

5. Volgende (gezamenlijke) vergadering

Dinsdag 24 januari