

**Mevr. V. de Vries - van Jansen**

Voorstraat 2
1234 PC Amsterdam

Health Base

Adres | Postcode Plaats | Telefoon
E-mail | Website
vrije tekst regel

Omeprazol capsule msr 20 mg Sandoz

Werking

■ Het werkzame middel

Het werkzame middel in dit medicijn is **omeprazol**. In elke capsule zit 20 mg omeprazol.

■ Waar het medicijn voor is

Klachten die ontstaan door (teveel) maagzuur. Bijvoorbeeld brandend maagzuur, omhoog komen van maagzuur, een maagzweer of een ontsteking van de slokdarm.

Het wordt ook gebruikt om de maag en darm te beschermen. Bijvoorbeeld na een operatie of als u bepaalde medicijnen gebruikt.

■ Hoe dit medicijn werkt

Het vermindert de hoeveelheid maagzuur. Hierdoor verminderen klachten. Ook beschermt het zo tegen problemen die door maagzuur kunnen ontstaan, zoals een maagzweer of een bloeding in de maag of darm.

■ Wanneer het begint te werken

De werking begint binnen enkele uren. Soms kan het een paar dagen duren voordat de klachten verminderen.

Bijwerkingen

Hier staan de meest voorkomende of belangrijke bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:

- hoofdpijn
- maag-darmklachten, zoals buikpijn, diarree, misselijk zijn.

Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de apotheker of arts.

Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw apotheker of arts.

Voor u dit medicijn gaat gebruiken

■ Gebruik met uw andere medicijnen

Volgens onze gegevens gebruikt u nu de volgende medicijnen:

- **Omeprazol capsule msr 20 mg Sandoz** (omeprazol)
- **Acenocoumarol tablet 1 mg Teva** (acenocoumarol)

We hebben gecontroleerd of omeprazol samen gaat met uw andere medicijnen. Wij hebben de volgende adviezen voor u:

i Bij omeprazol en acenocoumarol

U kunt deze medicijnen samen gebruiken. Maar het is belangrijk dat de trombosedienst weet dat u omeprazol gebruikt. Omeprazol kan namelijk invloed hebben op de werking van acenocoumarol. De stolling van het bloed kan daardoor veranderen.

De apotheek neemt daarom contact op met de trombosedienst. Soms vragen wij u om dat zelf te doen. Zo nodig roept de trombosedienst u eerder op voor controle. Weet u niet zeker wat u moet doen? Vraag het dan bij ons na.

Meld altijd zelf aan de trombosedienst als u stopt met omeprazol.

Als de gegevens niet kloppen of bij wijzigingen

Geef aan ons door als onze gegevens over uw medicijngebruik niet kloppen. Bijvoorbeeld als de dosering van uw medicijnen anders is. Geef ook aan ons door als u stopt met het gebruik. En als u weer start met medicijnen die u nog in huis heeft.

De apotheek controleert of u uw medicijnen samen kunt gebruiken. Dit kan alleen voor middelen die bij de apotheek bekend zijn. Vraag daarom advies bij:

- medicijnen zonder recept van de apotheek, drogist of supermarkt
- middelen zoals vitamines, kruidenmiddelen of homeopathie.

■ Gebruik bij uw andere ziekten of klachten

Niet gebruiken bij

Een vastgestelde verandering in het hartritme, namelijk het lange QT-syndroom (LQTS). Overleg dan met de apotheker of arts.

Let op bij

Vastgestelde levercirrose (de lever werkt niet goed). Overleg met de apotheker of arts of u dit middel kunt gebruiken.

i Omeprazol bij levercirrose

Volgens onze gegevens heeft u levercirrose. U kunt omeprazol gebruiken. Soms kan de arts besluiten u een andere dosering te geven.

Krijgt u last van bijwerkingen? Neem dan contact op met de arts.

Gaat de lever verder achteruit? Geef dit aan de apotheek door. Dan kijken we opnieuw of u dit medicijn kunt gebruiken.

■ Gebruik bij zwangerschap

U kunt dit middel gebruiken als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

■ Gebruik bij borstvoeding

U kunt dit middel gebruiken als u borstvoeding geeft.

Het gebruik van dit medicijn

Innemen met een half glas water. Niet kauwen of fijnmaken.

Bij slikproblemen kunt u de capsule openen en de inhoud innemen met een half glas water. U mag de inhoud ook mengen met appelmoes of vruchtensap. De korrels niet kauwen of fijnmaken. Meteen innemen. Het glas nog een keer naspoelen met water en opdrinken.

■ Uw dosering

1 keer per dag 1 capsule

■ Gebruikelijke doseringen

Volwassenen: meestal 1 of 2 maal per dag innemen. Per keer 1 of 2 capsules. Niet meer dan 4 capsules per dag. Soms worden hogere doseringen gebruikt (tot 6 capsules per dag).

■ Hoe lang gebruiken

De arts bespreekt hoe lang u dit middel moet gebruiken. Meestal 2 tot 8 weken.

Krijgt u dit middel als maagbeschermer bij een ander medicijn? Gebruik het dan zolang als u het andere medicijn gebruikt.

■ Bij een vergeten dosering

Duurt het langer dan 2 uur voor u de volgende moet innemen? Neem de vergeten dosering alsnog in. Duurt het minder dan 2 uur voor de volgende? Sla dan de vergeten dosering over.

■ Stoppen met het gebruik

Stop niet plotseling als u dit middel enkele weken heeft gebruikt. Verminder de dosering langzaam. Zo voorkomt u dat klachten terugkomen. Een schema kan zijn:

- Gebruik 1 tot 2 weken de helft van de dosering.
- Daarna 1 tot 2 weken om de dag innemen.
- Daarna stoppen.

Vraag zo nodig advies aan de apotheker of arts.

■ Bewaren

Bewaar bij kamertemperatuur in de verpakking. De houdbaarheidsdatum staat op de verpakking of op het etiket.

Andere adviezen

Krijgt u maagklachten van bepaald eten of drinken? Kijk of het helpt als u het niet meer neemt. Stoppen met roken helpt ook tegen maagklachten. Ook afvallen en geen alcohol kunnen helpen. Heeft u 's nachts klachten? Slaap dan met het hoofd hoger.

Gebruik geen (ontstekingsremmende) pijnstillers die zonder recept te koop zijn. Vraag hierover altijd eerst advies bij uw apotheek of arts. Deze pijnstillers kunnen namelijk maagklachten veroorzaken of erger maken.

Kenmerken van dit medicijn

capsules.

Voor dit middel is een recept van de arts nodig.

Bij vragen, of voor meer informatie

Overleg met de apotheker of arts bij vragen over het gebruik van dit medicijn.

Uw ervaring met medicijnen is waardevol voor anderen. Het kan helpen informatie over medicijnen te verbeteren. Meld ervaringen met bijwerkingen daarom op: www.mijnbijwerking.nl. Meld andere ervaringen op: www.meldpuntmedicijnen.nl.

Wilt u meer weten over uw ziekte? Of er over praten met anderen? Uw apotheker of arts kan informatie geven over patiënten-organisaties. Of kijk op de website van de Patiëntenfederatie Nederland: www.patiëntenfederatie.nl.

Over deze medicijn-informatie

Deze medicijn-informatie is voor u persoonlijk samengesteld.

Daarom is deze niet geschikt voor andere mensen.

Deze informatie komt ook niet in de plaats van de bijsluiter van de fabrikant of aanwijzingen van de arts. Het is een selectie uit wat bekend is over dit medicijn. Het bevat dus niet alle mogelijke waarschuwingen en bijwerkingen.

Merkt u verschillen op tussen de bijsluiter en deze informatie?

Vraag dan de apotheker of arts om meer uitleg.

Laatste wijziging in deze informatie: 19 maart 2019.

Informatie van de apotheek

eindtekst