



Wijzigingen t.o.v. vorige versie (zie ook taxebrief voor meer informatie):

Deze interacties zijn nieuw.

Deze interacties zijn gewijzigd (niveau afh., onderdrukkingstermijn of tekst Pharmacom/Medicom)

| Code IA | Kenmerken/Interactienaam | Kenmerken/Interactienaam | Teksten Pharmacom | Teksten Medicom | niveau afh. | termijn A | termijn B | GIT-tekstblok |
|---------|--------------------------|--------------------------|--|--|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | GENEESMIDDEL | GALZUURBIND. HARS | Opname diverse geneesmiddelen kan verminderen. Zie commentaren medicatiebewaking. | Opname diverse geneesmiddelen kan verminderen. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 2 | VKA's | ANDROGENEN | Bij eerste uitgifte androgeen: gewijzigde antistolling. Zie commentaar. | Bij start androgeen: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 3 | ENZYMINDUCTOREN | ANTICONCEPTIVA | Anticonceptie wordt minder betrouwbaar: overleg met apotheker. | Anticonceptie wordt minder betrouwbaar. Zie commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 4 | VKA's | ANTIBIOTICA | Bij eerste uitgifte antibioticum: gewijzigde antistolling. Informeer TD. | Bij start antibioticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 5 | VKA's | ENZYMINDUCTOREN | Niet afleveren; bij EU enzyminductor: gewijzigde antistolling. Zie commentaar. | Bij start enzyminductor: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 6 | ANTI-EPILEPTICA | FOLIUMZUUR | Alleen afleveren als patient op deze combinatie is ingesteld. Zo niet: overleg met apotheker. | Kans op verminderde aanvalscontrole. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 7 | VKA's | NSAID's | Niet afleveren; verhoogd bloedingsrisico. Bij handhaven NSAID >1 week: informeer TD. Zie commentaar. | Bij start NSAID: verhoogd bloedingsrisico. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 8 | VKA's | SSRI's/SNRI's | Bij eerste uitgifte antidepressivum: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start antidepressivum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 9 | ACETYLSALICYLZUUR | BENZBRO./PROBENEC. | Kans op verminderd effect benzbromaron en probenecide. Raadpleeg commentaar. | Kans op verminderd effect benzbromaron en probenecide. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 11 | VKA's | FIBRATEN | Bij eerste uitgifte fibraat: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start fibraat: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 12 | SULFONYLUREUMDER. | FENYLBUTAZON | Kan hypoglykemie veroorzaken. Alternatief: ander NSAID. Overleg met apotheker. | Kan hypoglykemie veroorzaken. Alternatief: ander NSAID. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 14 | VKA's | ALLOPURINOL | Bij eerste uitgifte allopurinol: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start allopurinol: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 15 | ANTIDIABETICA | BETA-BLOKKERS | Overweeg alternatief voor niet-selectieve beta-blokker. Overleg met apotheker. | Overweeg alternatief voor niet-selectieve beta-blokker. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 16 | SULFONYLUREUMDER. | SULFONAMIDEN | Kans op hypoglykemie. Niet afleveren zonder overleg met apotheker. | Kans op hypoglykemie; kies zo mogelijk ander anti-microbieel middel. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 17 | DIGOXINE | DIURETICA | Bij dalen kaliumspiegel verhoogde | Bij dalen kaliumspiegel verhoogde | ASS | 12 mnd | 12 mnd | Ja |

Onderdrukkingstermijn A: na afhandeling eerste uitgifte (deze waarde invullen in onderhoudsscherm van BOS-tekst);

Onderdrukkingstermijn B: als patiënt op het middel is ingesteld (NIET bij BOS-tekst invullen; betreft advies bij de individuele afhandeling van een interactie). Zie BOS/MBJ Toelichting Adviestermijn voor BOS-onderdrukking.

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|--|---|-----|--------|--------|----|
| | | | toxiciteit digoxine. Overleg met apotheker. | toxiciteit digoxine. | | | | |
| 18 | SULFONYLUREUMDER. | THIAMFENICOL | Kans op hypoglykemie. Overleg met apotheker, zie CM. | Kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 19 | CLONIDINE | TCA's/MIRTAZAPINE | Kans op verhoging van bloeddruk. Controle van bloeddruk gewenst. Overleg met apotheker. | Kans op verhoging van bloeddruk. Controle van bloeddruk gewenst. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 20 | DIGOXINE | ITRA/ISAVUC/KETOC. | Verhoogde toxiciteit digoxine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde digoxinespiegel mogelijk. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 21 | VIT A-ANALOGA | TETRACYCLINES | Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op verhoging van de intracraniele druk. Vermijd de combinatie. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 22 | ERGOTAMINE | CYP3A4-REMMERS | Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op ergotisme. Vermijd de combinatie. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 23 | CHINOLONEN | COMPLEX. VERBIND. | Resorptie antibioticum kan afnemen. Overleg met apotheker. | Resorptie antibioticum kan afnemen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 24 | METRONIDAZOL | DISULFIRAM | Kans op ernstige verwardheid. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op ernstige verwardheid. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 25 | CLARI/ERYTROMYCINE | THEOFYLLINE | Kans op verhoging van theofylline bloedspiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verhoging van theofylline bloedspiegel. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 26 | CIPRO/NORFLOXACINE | THEOFYLLINE | Theofyllinespiegel kan stijgen. Kans op convulsies. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Theofyllinespiegel kan stijgen. Kans op convulsies. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 29 | ANTI-ARITMICA, KL3 | ANTI-ARITMICA, KL1 | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 30 | DIGOXINE | AMIODARON | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 31 | DIGOXINE | DILTIAZ./VERAPAMIL | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op verhoogde digoxinespiegel en toxiciteit. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 32 | DIGOXINE | KINIDINE | Verhoogde toxiciteit digoxine. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker. | Verhoogde toxiciteit digoxine; frequente controle gewenst. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 33 | KINIDINE | URINE ALKALIS.STOF | Kans op kinidine-intoxicatie. Overleg met apotheker. | Kans op kinidine-intoxicatie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 34 | FOLIUMZUURANTAGON. | SALICYLATEN/NSAID | Toxiciteit van foliumzuurantagonist kan worden verhoogd. Overleg met apotheker, zie commentaren. | Toxiciteit van foliumzuurantagonist kan worden verhoogd. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 6 mnd | Ja |
| 35 | METHOTREXAAT | COTRIMOX/TRIMETHO. | Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op ernstige bloedbeeldafwijkingen. Kies ander antibioticum. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 36 | CYTOSTATICA | XANTHINE-OX.REMMER | Kans op verhoogde spiegel mercaptopurine. Overleg met apotheker. Raadpleeg CM. | Kans op verhoogde spiegel mercaptopurine. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 39 | LITHIUM | THIAZIDEDIURETICA | Risico op lithium-intoxicatie. Aanpassen dosis/controle lithium- spiegel nodig. Overleg met apo. | Risico op lithium-intoxicatie. Aanpassen dosis/controle lithium- spiegel nodig. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 6 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--------------------|---|---|-----|--------|--------|----|
| 40 | K.SP.AR.DIURETICA | KALIUM | Controle van kaliumgehalte van het bloed gewenst. Overleg met apotheker. | Controle van kaliumgehalte van het bloed gewenst. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 42 | DOPAMIN. MIDDELEN | ANTIPSYCHOTICA | Kans op verminderd effect (fos)levodopa/dopamineagonist. Niet afleveren. Overleg met apo. | Kans op verminderd effect (fos)levodopa/dopamineagonist. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 43 | ISONIAZIDE | DISULFIRAM | Verhoogde kans op centrale bijwerkingen. Combinatie zo mogelijk vermijden. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op centrale bijwerkingen. Combinatie zo mogelijk vermijden. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 45 | VKA's | DISULFIRAM | Bij eerste uitgifte disulfiram: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start disulfiram: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 47 | KETANSERINE | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritme-stoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoorissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 48 | THEOFYLLINE | CYP1A2 - REMMERS | Kans op verhoogde theofylline- spiegel. Vervang CYP1A2-remmer. Overleg met apo. Zie commentaar. | Kans op verhoogde theofyllinespiegel. Vervang CYP1A2- remmer. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 49 | THEOFYLLINE | ENZYMINDUCTOREN | Kans op te lage theofyllinespiegel. Overleg met apotheker. | Kans op te lage theofyllinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 50 | AZOLANTIMYCOTICA | VKA's | Bij eerste uigifte antimycoticum: informeer trombosedienst en patient. Zie commentaar/www.fnt.nl. | Bij start antimycoticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 52 | AZOLANTIMYCOTICA | ANTACIDA/CARBONAAT | Adviseer patient om antacidum/ carbonaat minstens 2 uur voor of 2 uur na antimycoticum te nemen. | Resortie van antimycoticum kan worden verminderd. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 53 | VKA's | METRONIDAZOL | Bij eerste uitgifte metronidazol: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start metronidazol: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 54 | VKA's | AMIODARON/PROPAF. | Bij eerste uitgifte anti-aritmicum: gewijzigde antistolling; informeer TD. Zie commentaar. | Bij start anti-aritmicum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 55 | VKA's | THYREOMIMETICA | Bij eerste uitgifte thyreomimeticum: gewijzigde antistolling; informeer TD. Zie commentaar. | Bij start thyreomimeticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 56 | NSAID's | RAS-REMMERS | Kans op verminderd effect RAS-remmer. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect RAS-remmer. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 57 | VALPROINEZUUR | ANTI-EPILEPTICA | Bloedspiegels van beide middelen kunnen sterk wijzigen. Overleg met apotheker. | Bloedspiegels van beide middelen kunnen sterk wijzigen. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 60 | RAS-REMMERS | LITHIUM | Risico op lithium-intoxicatie. Aanpassen dosis/controle lithium- spiegel nodig. Overleg met apo. | Risico op lithium-intoxicatie. Aanpassen dosis/controle lithium- spiegel nodig. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 6 mnd | Ja |
| 61 | BETA-BLOKKERS | NSAID's | Verminderde antihypertensieve respons op beta-blokker. Overleg met apotheker. Zie CM. | Verminderde antihypertensieve respons op beta-blokker. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 62 | LITHIUM | NSAID's | Risico op lithium-intoxicatie. Controle lithiumspiegel is nodig, evt dosis aanpassen. Overleg met apo | Risico op lithium-intoxicatie. Controle lithiumspiegel is nodig, evt dosis aanpassen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|--|--|-----|--------|--------|----|
| 63 | LISDIURETICA | NSAID's | Kans op verminderde werking lisdiureticum. Overleg met apotheker. | Kans op verminderde werking lisdiureticum. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 64 | CIMETIDINE | FENYTOINE | Verhoogde fenytoinespiegel. Vervang cimetidine door alternatief. Overleg met apotheker. | Verhoogde fenytoinespiegel. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 65 | IJZER | METHYLDOPA | Effect methyldopa kan afnemen. Overleg met apotheker of arts. | Effect methyldopa kan afnemen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 66 | KETANSERINE | K-ELIM. DIURETICA | Verhoogde kans op ernstige ritme-stoornissen: niet afleveren! Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritme-stoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 68 | ISONIAZIDE | CARBAMAZEPINE | Verhoogde kans op een intoxicatie door verhoogde carbamazepinespiegel. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op een intoxicatie door verhoogde carbamazepinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 70 | PENICILLAMINE | COMPLEX.VERBIND. | Effect penicillamine kan afnemen. Overleg met apotheker of arts. | Effect penicillamine kan afnemen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 71 | METHOTREXAAT | PROBENECIDE | Kans op verhoogde methotrexaat-bloedspiegel. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren. | Kans op verhoogde methotrexaat-bloedspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 72 | ANTI-ARITMICA, KL1 | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect van anti-aritmicum. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect van anti-aritmicum. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 73 | BCG- /TYFUS VACCIN | ANTIBIOTICA | Vaccin onwerkzaam door antibioticum. Informeer patient of overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Vaccin onwerkzaam door antibioticum. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 74 | FENYTOINE | ISONIAZIDE | Verhoogde kans op een intoxicatie door verhoogde fenytoinespiegel; overleg met apotheker. | Verhoogde kans op intoxicatie. Controleer fenytoinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 75 | TCA's | SYMPATICOMIMETICA | Werking van het sympathicomimeticum kan worden versterkt. Overleg met apotheker. | Werking van het sympathicomimeticum kan worden versterkt. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 78 | URINE-ALKAL STOF | METHENAMINE | Methenamine onwerkzaam. Overleg met apotheker. Kies alternatief, zie comm. | Methenamine onwerkzaam. Overweeg andere urineweg-profylaxe. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 79 | IMMUNOSUPPRESSIVA | NEFROTOX.GENEESM. | Verhoogde kans op nierbeschadiging. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde kans op nierbeschadiging. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 6 mnd | Ja |
| 80 | IMMUNOSUPPRESSIVA | ENZYMINDUCTOREN | Versterkte afbraak van immunosuppressivum. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Versterkte afbraak van immunosuppressivum. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 81 | CICLOSPORINE | CYP3A4/Pgp-REMMERS | Verhoogde ciclosporinespiegel. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde ciclosporinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 82 | RAS-REMMERS | DIURETICA | Kans op sterke bloeddrukdaling. Start RAS-remmer eerste 3 dagen in laagste dosis + 1e dosis s avonds | Kans op sterke bloeddrukdaling Bij starten RAS-remmer eerste 3 dagen laagste startdosis. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 83 | RAS-REMMERS | K.SP.AR.DIURET./ K | Verhoogde kans op hyperkaliemie. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op hyperkaliemie. Raadpleeg commentaar. | ASS | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 84 | CARBAMAZEPINE | CLARI/ERYTROMYCINE | Verhoogde carbamazepinespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde carbamazepinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 86 | BUPRENORFINE | MORFINOMIMETICA | Veranderde respons op morfinomimetica mogelijk. Overleg met | Veranderde respons op morfinomimetica mogelijk. Raadpleeg | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |

| | | | apotheker. Zie commentaar. | commentaar. | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|--|-----|--------|--------|----|
| 87 | FENYTOINE | FENYLBUTAZON | Verhoogde fenytoïnespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde fenytoïnespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 88 | FENYTOINE | DISULFIRAM | Kans op fenytoïne-intoxicatie. Overleg met apotheker. | Kans op fenytoïne-intoxicatie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 89 | VKA's | THYREOSTATICA | Bij eerste uitgifte thyreostaticum: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start thyreostaticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 91 | VKA's | TAMOXIFEN | Bij eerste uitgifte tamoxifen: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start tamoxifen: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 92 | DILTIAZ./VERAPAMIL | BETA-BLOKKERS | Alleen afleveren indien de patient op deze combinatie is ingesteld. Zo niet, overleg met apotheker. | Kans op hypotensie en cardiale geleidingsstoornissen. Raadpleeg commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 93 | CALCIUMANTAGONIST | CIMETIDINE | Niet afleveren. Verhoging spiegel calciumantagonist. Vervang cimetidine door alternatief. Overleg met apo. | Verhoging spiegel calcium- antagonist. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 95 | CO-TRIMOXAZOL | VKA's | Niet afleveren: sterk gewijzigde antistolling. Vervang co-trimoxazol. Overleg met apo, zie comm. | Sterk gewijzigde antistolling. Geef alternatief voor co-trimoxazol. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 96 | SSRI's/SNRI's | TCA's | Kans op sterk verhoogde spiegel antidepressivum: zie commentaar. Overleg met apotheker. | Kans op sterk verhoogde spiegel antidepressivum: zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 97 | LIPIDENVERL.MIDDEL | COLESTYRAMINE | Vervang fluvastatine. Andere lipidenverlager: minstens 2 uur voor of 4 uur na colestyramine. | Vervang fluvastatine. Andere lipidenverlager: minstens 2 uur voor of 4 uur na colestyramine. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 99 | FLUOXET./FLUVOXAM. | CARBAMAZEPINE | Kans op verhoogde carbamazepinespiegel. Niet afleveren zonder overleg met apotheker. | Kans op verhoogde carbamazepinespiegel. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 100 | FLUVOXAMINE | THEOFYLLINE | Theofyllinespiegel kan stijgen. Kans op convulsies. Niet afleveren, overleg met apotheker. | Theofyllinespiegel kan stijgen. Alternatief: zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 104 | DIGOXINE | PROPAFENON | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 106 | STATINES | CICLOSPORINE | Kans op ernstige spierpijn-/zwakte. Overleg met apotheker. Instrueer patient: spierpijn melden. | Kans op ernstige rhabdomyolyse. Instrueer patient: spierpijn melden. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 107 | MIDA-/TRIAZOLAM | CLARI/ERYTROMYCINE | Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Overleg met apotheker. | Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 108 | MIDAZOL/TRIAZOLAM | AZOLANTIMYCOTICA | Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Overleg met apotheker. | Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 109 | MIDA-/TRIAZOLAM | VERAPAMIL/DILTIAZ. | Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Overleg met apotheker. | Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 110 | STATINES | FIBRATEN | Combinatie bij voorkeur vermijden. | Combinatie bij voorkeur vermijden. Zie | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|--|-----|--------|--------|----|
| | | | Overleg met apotheker. | commentaar. | | | | |
| 114 | (ES)OMEPRAZOL | FENYTOINE | Kans op te hoge fenytoinespiegel bij (es)omeprazol 40 mg dd en hoger. Overleg met apotheker. | Kans op te hoge fenytoinespiegel bij (es)omeprazol 40 mg dd en hoger. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 115 | VKA's | FENYLBUTAZON | Niet afleveren; sterk verhoogd bloedingsrisico. Overleg met apotheker. | Zie commentaren medicatiebewaking. Sterk verhoogd bloedingsrisico. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 116 | VKA's | ACETYLSALICYLZUUR | Niet afleveren; verhoogd bloedingsrisico. Overleg met apotheker. Bij handhaven: informeer TD. | Bij start acetylsalicylzuur: verhoogd bloedingsrisico. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 117 | THYREOMIMETICA | COMPLEX. VERBIND. | Opname thyreomimeticum kan afnemen. Overleg met apotheker. | Resorptie thyreomimeticum kan afnemen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 119 | CIMETIDINE | TRICYCL.ANTIDEP.R. | Verhoogde kans op toxiciteit antidepressivum. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op toxiciteit antidepressivum. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 120 | CIMETIDINE | CARBAMAZEPINE | Verhoogde carbamazepinespiegel. Niet afleveren. Vervang cimetidine door alternatief. Overleg met apo. | Verhoogde carbamazepinespiegel. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 121 | DANAZOL | CARBAMAZEPINE | Verhoogde carbamazepinespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde carbamazepinespiegel. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 123 | DOXYCYCLINE | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect doxycycline. Verhoog zo nodig dosering(sfrequentie). Zie comment. | Kans op verminderd effect doxycycline. Verhoog zo nodig dosering(sfrequentie). Zie comment. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 124 | RIFAMPICINE | FENYTOINE | Kans op verminderd effect van fenytoine. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect van fenytoine. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 125 | FENYTOINE | TRIMETHOPRIM/SULFA | Verhoogde fenytoinespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde fenytoinespiegel. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 126 | CARBAMAZ/FENYTOINE | FLUCO/MICONAZOL | Verhoogde spiegel carbamazepine/fenytoine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde spiegel carbamazepine/fenytoine. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 127 | ISONIAZ.+RIFAMPIC. | CARBAMAZ/FENYTOINE | Kans op gewijzigde spiegel carbamazepine/fenytoine. Mogelijk ernstige leverbeschadiging. Overleg met apo. | Kans op gewijzigde spiegel carbamazepine/fenytoine. Mogelijk ernstige leverbeschadiging. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 128 | B-2-SYMP-.MIMETICA | BETA-BLOKKERS | Effect beta-2-mimeticum verminderd. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Effect beta-2-mimeticum verminderd. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 129 | LITHIUM | ANTIBIOTICA | Risico op lithium-intoxicatie. Overleg met apotheker. Informeer patient. | Risico op lithium-intoxicatie. Informeer patient. Zie commentaar. | ASS | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 130 | MAO-REMMERS | MORFINOMIMETICA | Niet afleveren. Kans op serotoninesyndroom. Overleg met apotheker. | Kans op serotoninesyndroom. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 131 | THEOFYLLINE | DISULFIRAM | Kans op verhoging theofylline- spiegel en kans op -intoxicatie. Overleg met apotheker. | Kans op verhoging theofylline- spiegel en kans op -intoxicatie. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 132 | DIGOXINE | MACROLIDEN | Kans op digoxine-intoxicatie. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op digoxine-intoxicatie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 134 | ISAVU-/ITRACONAZOL | ENZYMINDUCTOREN | Isavu-/itraconazol wordt onwerkzaam. Niet afleveren, overleg met apotheker. | Isavu-/itraconazol wordt onwerkzaam. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 136 | LOVA./SIMVASTATINE | VERAPAMIL/DILTIAZ. | Verhoogde kans op toxiciteit statine. | Verhoogde kans op myopathie en | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|--|-----|--------|--------|----|
| | | | Overleg met apotheker. | rhabdomyolyse. Zie commentaar. | | | | |
| 138 | ALLERGENEN | IMMUNOSUPPRESSIVA | Mogelijk verminderd effect allergeen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Mogelijk verminderd effect allergeen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 139 | ALLERGENEN | BETA-BLOKKERS | Bij anafylactische shock werkt noodmedicatie onvoldoende. Niet afleveren. Overleg met apo. | Bij anafylactische shock werkt noodmedicatie onvoldoende. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 140 | IJZERVERBINDINGEN | COMPLEX. VERBIND. | Resorptie ijzer kan afnemen. Overleg met apotheker. | Resorptie ijzer kan afnemen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 142 | MOCLOBEMIDE | MAO-B-REMMERS | Kans op sterke bloeddrukstijging. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op sterke tensiestijging, combinatie vermijden. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 144 | ANTI-ARITMICA | CIMETIDINE | Niet afleveren. Kans op spiegel- stijging anti-aritmicum. Vervang cimetidine door alt. Overleg met apo | Deze combinatie bij voorkeur vermijden. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 145 | SULFONYLUREUMDER. | AZOLANTIMYCOTICA | Kans op hypoglykemie. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 148 | TACROLIMUS | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde tacrolimusspiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde tacrolimusspiegel. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 150 | STATINES | AZOLANTIMYCOTICA | Kans op ernstige spierpijn/-zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 153 | ANTIPSYCHOTICA | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 155 | MAO-REMMERS | ANTIDEPRESSIVA | Kans op serotonine-syndroom. Niet afleveren. Let op: wash-out periode. Overleg met apotheker. | Kans op serotonine-syndroom. Let op: wash-out periode. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 156 | PDE-5-REMMERS | NITRATEN | Kans op sterk verlaagde bloeddruk. Zie commentaar voor afhandeling. | Kans op sterk verlaagde bloeddruk. Zie commentaar voor afhandeling. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 157 | SYMPATHICOMIMETICA | MAO-REMMERS | Kans op sterke bloeddrukstijging. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op sterke tensiestijging. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 158 | VKA's | VITAMINE K | Verminderd effect VKA. Vitaminepreparaat niet afleveren. Starten voeding melden aan TD. | Verminderd effect VKA. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 159 | DEXTROMETHORFAN | MAO-REMMERS | Kans op ernstige serotonerge toxiciteit. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op ernstige serotonerge toxiciteit. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 160 | STATINES | CLARI/ERYTROMYCINE | Kans op ernstige spierpijn/-zwakte. Niet combineren. Overleg met apotheker. | Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Niet combineren. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 161 | FLUVOXAMINE | CLOZAPINE | Niet afleveren. Kans op sterk verhoogde clozapinespiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op sterk verhoogde clozapinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 163 | DIHYDROPYRIDINES | CYP3A4-REMMERS | Kans op versterkt effect calciumantagonist. Overleg met apotheker. | Kans op versterkt effect calciumantagonist. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 164 | CORTICOSTEROIDEN | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd therapeutisch effect van corticosteroid; overleg met apotheker. | Versterkte afbraak van corticosteroiden; eventueel dosis corticosteroid aanpassen. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 165 | FLUCONAZOL | RIFAMPICINE | Kans op verminderd effect van fluconazol. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect van fluconazol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------|---|---|-----|--------|--------|----|
| 166 | KINIDINE | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 167 | PIMOZIDE | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 169 | TCA's | TERBINAFINE | Sterke stijging TCA-spiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Sterke stijging TCA-spiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 170 | TCA's | BUPROPION | Kans op stijging spiegel TCA. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker. | Kans op stijging spiegel TCA. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 171 | CORTICOSTEROIDEN | NSAIDs | Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts. | Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 172 | VKA's | DISOPYRAM/KINIDINE | Bij eerste uitgifte anti-aritmicum gewijzigde antistolling; informeer TD. Zie commentaar. | Bij start anti-aritmicum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 173 | SINT-JANSKRUID | DIGOXINE | Niet afleveren. Verminderde werking digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verminderde werking digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 174 | QUETIAPINE | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 176 | CICLOSPORINE | CLINDAMYCINE | Kans op daling ciclosporinespiegels. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op daling ciclosporinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 178 | CICLOSPORINE | ORLISTAT | Niet afleveren. Kans op verlaagde ciclosporinespiegel. Overleg met apotheker. | Kans op verlaagde ciclosporinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 180 | PILOCARPINE | ANTICHOLIN. MIDDEL | Verminderd effect van pilocarpine. Raadpleeg apotheker. | Verminderd effect van pilocarpine. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 184 | BUSPIRON | CYP3A4 REMMERS | Niet afleveren. Stijging buspironspiegel. Overleg met apotheker. | Stijging buspironspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 188 | ATOVAQUON | METOCLOPRAMIDE | Kans op verminderd effect van atovaquon. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect van atovaquon. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 189 | ATOVAQUON | RIFAMP./RIFABUTINE | Kans op verminderd effect van atovaquon. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect van atovaquon. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 190 | ELETRIPTAN | CYP3A4-REMMERS | Kans op verhoogde toxiciteit van eletriptan. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op verhoogde toxiciteit van eletriptan. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 191 | IBUPROFEN/INDOMET | ACETYLSALICYLZUUR | Niet afleveren. Verminderd effect van acetylsalicylzuur. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Geef alternatief voor ibuprofen/indometacine. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 192 | ROPINIROL | CYP1A2-REMMERS | Kans op toename bijwerkingen van ropinirol. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op toename bijwerkingen van ropinirol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 194 | IMMUNOSUPPRESSIVA | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde spiegel immunosuppressivum. Niet afleveren. | Verhoogde spiegel immunosuppressivum. Raadpleeg | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|--|-----|--------|--------|----|
| | | | Overleg met apotheker. | commentaar. | | | | |
| 195 | ALBENDA/MEBENDAZOL | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect van albendazol/mebendazol. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect van albendazol/mebendazol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 197 | OPIAATAGONISTEN | OPIAATANTAGONISTEN | Niet afleveren. Verminderd effect van opiaat. Overleg met apotheker. | Verminderd effect van opiaat. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 198 | LEFLUNOMIDE | METHOTREXAAT | Verhoogde kans op leverfunctiestoornissen. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op leverfunctiestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 199 | CALCIUMANTAGONIST | ENZYMINDUCTOREN | Kans op sterk verminderd effect calciumantagonist. Overleg met apotheker. Zie comm. | Kans op sterk verminderd effect van calciumantagonist. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 200 | DISOPYRAMIDE | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 201 | VKA's | COLESTYRAMINE | Gewijzigde antistolling. VKA 4 uur gescheiden van colestyramine innemen. Informeer TD. Zie comm. | Gewijzigde antistolling. VKA 4 uur gescheiden van colestyramine innemen. Zie commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 202 | BISFOSFONATEN | COMPLEX. VERBIND. | Verminderde resorptie bisfosfonaat. Overleg met apotheker. | Verminderde resorptie bisfosfonaat. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 203 | IMMUNOSUPPRESSIVA | LEVENDE VACCINS | Kans op verminderd effect vaccin. Verhoogde kans op complicaties. Niet afleveren. Overleg met apo. | Kans op verminderd effect vaccin. Verhoogde kans op complicaties. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 204 | ALPRAZOLAM | CYP3A4-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel, toename werkingsduur/sedatie van alprazolam. Overleg met apotheker. | Kans op stijging plasmaspiegel, toename werkingsduur/sedatie van alprazolam. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 205 | ANTIDEPRESSIVA | ENZYMINDUCTOREN | Verminderd effect antidepressivum. Overleg met apotheker. | Verminderd effect antidepressivum. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 206 | ANTIPSYCHOTICA | ENZYMINDUCTOREN | Verminderd effect antipsychoticum. Overleg met apotheker. | Verminderd effect antipsychoticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 207 | BENZODIAZEPINES | ENZYMINDUCTOREN | Verminderd effect benzodiazepine. Overleg met apotheker. | Verminderd effect benzodiazepine. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 208 | CARBAMAZEPINE | ENZYMINDUCTOREN | Verminderde werking carbamazepine door verlaging plasmaspiegel. Raadpleeg apotheker. | Verminderde werking carbamazepine door verlaging plasmaspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 209 | KETOCONAZOL | CARBAMAZEPINE | Snelle stijging carbamazepinespiegel en verminderde werking ketoconazol. Overleg met apotheker. | Snelle stijging carbamazepinespiegel en verminderde werking ketoconazol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 210 | LITHIUM | THEOYL./ACETAZOLA | Lithiumspiegel kan dalen. Controle lithiumspiegel is nodig, evt dosis aanpassen. Overleg met apotheker. | Lithiumspiegel kan dalen. Controle lithiumspiegel is nodig, evt dosis aanpassen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 6 mnd | Ja |
| 213 | MIRTAZAPINE | FLUVOXAMINE | Toename plasmaspiegel mirtazapine. Overleg met apotheker. | Toename plasmaspiegel mirtazapine. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 214 | LAMOTRIGINE | ENZYMINDUCTOREN | Verminderde werking lamotrigine. Overleg met apotheker. | Verminderde werking lamotrigine. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 215 | ANTI-ARITMICA | CYP2D6-REMMERS | Kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|---|-----|--------|--------|----|
| 216 | DEXTROMETHORFAN | SSRI's | Kans op ernstige serotonerge toxiciteit. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op ernstige serotonerge toxiciteit. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 217 | FENYTOINE | FLUOXET./FLUVOXAM. | Verhoogde bloedspiegel fenytoïne. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker. | Verhoogde bloedspiegel fenytoïne. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 219 | METOPROLOL | CYP2D6-REMMERS | Stijging metoprololspiegel waardoor kans op bijwerkingen toeneemt. Zie commentaren. Raadpleeg apotheker. | Stijging metoprololspiegel waardoor kans op bijwerkingen toeneemt. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 222 | TCA'S | CYP2D6-REMMERS | Kans op sterke stijging plasmaspiegel TCA. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op sterke stijging plasmaspiegel TCA. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 228 | CYP1A2-REMMERS | OLANZAPINE | Kans op verhoogde olanzapinespiegel en toename bijwerkingen. Overleg met apotheker, zie commentaar. | Kans op verhoogde olanzapinespiegel en toename bijwerkingen. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 230 | POSACONAZOL | ENZYMINDUCTOREN | Kans op therapiefalen posaconazol. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op therapiefalen posaconazol. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 232 | CEFUROXIMAXETIL | ANTACIDA/CARBONAAT | Verminderd effect cefuroximaxetil. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verminderd effect cefuroximaxetil. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 233 | IMMUNOSUPPRESSIVA | BOSENTAN | Verminderd effect immunosuppressivum door verlaging plasmaspiegel. Overleg met apotheker. | Verminderd effect immunosuppressivum door verlaging plasmaspiegel. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 234 | VKA's | ISONIAZIDE | Bij eerste uitgifte isoniazide: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start isoniazide: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 235 | VKA's | BENZBROMARON | Bij eerste uitgifte benzbromaron: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start benzbromaron: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 236 | VKA's | ANTI-RETROVIR.MID | Bij eerste uitgifte antiretroviraal middel: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start antiretroviraal middel: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 237 | LEVO-/CARBIDOPA | IJZERBINDINGEN | Kans op ontregeling parkinson. Zie commentaar. Raadpleeg apotheker. | Kans op ontregeling parkinson. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 238 | METHOTREXAAT | ACITRETINE | Verhoogde kans op leverbeschadiging. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op leverbeschadiging. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 239 | MOXIFLOXACINE | COMPLEX. VERBIND. | Resorptie moxifloxacin kan afnemen. Overleg met apotheker. | Resorptie moxifloxacin kan afnemen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 240 | ACH-ESTERASEREMMER | P-SYMPATHICOLYTICA | Kans op verminderd effect van cholinesteraseremmer. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect van cholinesteraseremmer. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 241 | SERTINDOL | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 242 | PROTEINEKINASE_REM | LOVA./SIMVASTATINE | Kans op myopathie en rabdomyolyse. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op myopathie en rabdomyolyse. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 243 | PROTEINEKINASE_REM | MIDA-/TRIAZOLAM | Sterke verlenging effect triazolam en midazolam. Overleg met apotheker. | Sterke verlenging effect triazolam en midazolam. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 244 | REPAGLINIDE | CYP2C8- REMMERS | Niet afleveren. Combinatie kan leiden tot hypoglykemie. Overleg met apotheker. | Combinatie gecontra-indiceerd. Kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|---|-----|--------|--------|----|
| 245 | VKA's | ROSUVASTATINE | Bij eerste uitgifte rosuvastatine: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start rosuvastatine: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 246 | NSAIDs | SSRI's/SNRI's | Verhoogd risico (maag)bloeding. Raadpleeg apotheker. | Verhoogd risico (maag)bloeding. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 247 | MICONAZOL | VKA's | Niet afleveren. Gewijzigde anti- stolling. Vervang miconazol. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Gewijzigde antistolling. Geef alternatief voor miconazol. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 248 | CARBAMAZEPINE | FENYTOINE | Gewijzigde carbamazepinespiegel, gewijzigde fenytoinespiegel. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker. | Gewijzigde carbamazepinespiegel, gewijzigde fenytoinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 249 | AMIODARON | FENYTOINE | Kans op toxiciteit fenytoïne. Kans op verlaging spiegel amiodaron. Niet afleveren. Overleg met apo. | Kans op toxiciteit fenytoïne. Kans op verlaging spiegel amiodaron. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 251 | ANTI-HORMONEN | OESTROGENEN | Werkings anti-hormoon vermindert. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Werkings anti-hormoon vermindert. Combinatie vermijden. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 252 | BEXAROTEEN | ANTICONCEPTIVA | Anticonceptie minder betrouwbaar. Adviseer aanvullende anticonceptie. Overleg met apotheker. | Anticonceptie minder betrouwbaar. Adviseer aanvullende anticonceptie. Zie commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 254 | ESTRAMUSTINE | CALCIUMVERBINDING | Resorptie estramustine kan afnemen. Overleg met apotheker. | Resorptie estramustine kan afnemen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 256 | FENYTOINE | (PRODRUG)-5-FU | Kans op fenytoïne-intoxicatie. Overleg met apotheker. | Kans op fenytoïne-intoxicatie. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 257 | FOLINEZ/FOLIUMZUUR | (PRODRUG)-5-FU | Toxiciteit van (pro-drug van) fluorouracil neemt toe. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Toxiciteit van (pro-drug van) fluorouracil neemt toe. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 259 | SINT-JANSKRUID | ANTIDEPRESSIVA | Verlaging spiegel antidepressivum. Soms kans op serotonine-syndroom. Niet afleveren. Overleg met apo. | Verlaging spiegel anti- depressivum. Soms kans op seroto- ninesyndroom. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 260 | VKA's | (PRODRUG)-5-FU | Bij eerste uitgifte cytostaticum: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start cytostaticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 261 | VKA's | (FOS)APREPITANT | Gewijzigde antistolling. Informeer trombosedienst. Informeer patient. Zie commentaar/www.fnt.nl | Gewijzigde antistolling. Informeer patient. Zie commentaar/www.fnt.nl | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 263 | EPLERENON | CYP3A4-REMMERS | Stijging eplerenon/finerenonspiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Stijging eplerenon/finerenonspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 264 | NK1-ANTAGONISTEN | ENZYMINDUCTOREN | Versterkte afbraak van neurokinine-antagonist. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Versterkte afbraak van neurokinine-antagonist. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 265 | COLCHICINE | CYP3A4/Pgp-REMMERS | Verhoogde kans op toxiciteit colchicine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op toxiciteit colchicine. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 266 | CLARI/ERYTROMYCINE | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 267 | TETRACYCLINE | COMPLEX. VERBIND. | Verminderde resorptie tetracycline. Overleg met apotheker. | Verminderde resorptie tetracycline. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|---|-----|--------|--------|----|
| 268 | DOXYCYCLINE | COMPLEX. VERBIND. | Verminderde resorptie doxycycline. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | Verminderde resorptie doxycycline. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 270 | LYME-/MINOCYCLINE | COMPLEX. VERBIND. | Verminderde resorptie antibioticum. Overleg met apotheker. | Verminderde resorptie antibioticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 271 | DEMECLOCYCLINE | COMPLEX. VERBIND. | Verminderde resorptie demeclocycline. Overleg met apotheker. | Verminderde resorptie demeclocycline. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 272 | CICLOSPORINE | ACETAZOLAMIDE | Verhoogde kans op toxiciteit ciclosporine (nierbeschadiging). Niet afleveren. Overleg met apo. | Verhoogde kans op toxiciteit ciclosporine (nierbeschadiging). Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 273 | SERTINDOL | CYP2D6-REMMERS | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 275 | TIZANIDINE | CYP1A2-REMMERS | Verhoogde toxiciteit tizanidine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde toxiciteit tizanidine. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 277 | ADRENALINE | BETA-BLOKKERS | Bij anafylactische shock werkt noodmedicatie onvoldoende. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Bij anafylactische shock werkt noodmedicatie onvoldoende. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 278 | DIGOXINE | CICLOSPORINE | Kans op digoxine-intoxicatie. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op digoxine-intoxicatie. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 279 | CICLOSPORINE | VITAMINE E | Gewijzigde ciclosporinespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Gewijzigde ciclosporinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 280 | LAMOTRIGINE | OESTROGENEN | Kans op verminderd effect lamotrigine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op verminderd effect lamotrigine. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 281 | CHINOLONEN | SEVELAMEER | Verminderd effect chinolon. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verminderd effect chinolon. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 284 | CICLOSPORINE | EVEROLIMUS | Toename bijwerkingen everolimus. Overleg met voorschrijver evero- limus. Raadpleeg apotheker/comm. | Toename bijwerkingen everolimus. Overleg met voorschrijver evero- limus. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 285 | CICLOSPORINE | (TEM)SIROLIMUS | Toename bijwerkingen (tem)sirolimus. Overleg met voorschrijver (tem)sirolimus. Raadpleeg apo/cm. | Toename bijwerkingen (tem)sirolimus. Overleg met voorschrijver (tem)-sirolimus. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 286 | CICLOSPORINE | METHOTREXAAT | Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat en ciclosporine. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat en ciclosporine. Raadpleeg commentaar. | APO | 6 mnd | 6 mnd | Ja |
| 287 | BUSPIRON | ENZYMINDUCTOREN | Verminderd effect buspiron. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verminderd effect buspiron. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 288 | MORFINOMIMETICA | ENZYMINDUCTOREN | Verminderd effect morfinomimeticum. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verminderd effect morfinomimeticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 289 | FENYTOINE | VKA's | Kans op gewijzigde antistolling en versterkt effect fenytoine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op gewijzigde antistolling en versterkt effect fenytoine. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 290 | THEOXYLLINE | DILTIAZ./VERAPAMIL | Kans op theofyllinetoxiciteit. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op theofyllinetoxiciteit. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 291 | PROTEINEKINASE_REM | CYP3A4-REMMERS | Kans op verhoogde toxiciteit van proteïnekinase-remmer. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op verhoogde toxiciteit van proteïnekinase-remmer: evt dosis verlagen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 292 | PROTEINEKINASE_REM | ENZYM/Pgp-INDUCTOR | Kans op verminderd therapeutisch effect van proteïnekinase-remmer. Overleg | Kans op verminderd therapeutisch effect van proteïnekinase-remmer: evt dosis | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|---|-----|--------|--------|----|
| | | | met apo. Raadpleeg comm. | aanpassen. Raadpleeg comm. | | | | |
| 293 | THEOXYLLINE | CARBAMAZ/FENYTOINE | Kans op te lage spiegels van theofylline en van anti-epilepticum. Overleg met apotheker. | Kans op te lage spiegels van theofylline en van anti-epilepticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 294 | AZOLANTIMYCOTICA | H2-ANTAGONISTEN | Overleg met apotheker. Opname van antimycoticum kan worden verminderd. Zie commentaar. | Resorptie van antimycoticum kan worden verminderd. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 295 | KETOCONAZOL | ENZYMINDUCTOREN | Verminderd therapeutisch effect van ketoconazol. Overleg met apotheker. | Verminderd therapeutisch effect van ketoconazol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 296 | KETOCONAZOL | RIFAMPICINE | Mogelijk verminderd therapeutisch effect ketoconazol en rifampicine. Niet afleveren. Overleg met apo. | Mogelijk verminderd therapeutisch effect ketoconazol en rifampicine. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 297 | CEFUROXIMAXETIL | ZUURSECRETIEREMMER | Verminderd effect van cefuroxim- axetil. Neem in bij de maaltijd. Zie commentaren. | Verminderd effect van cefuroxim- axetil. Neem in bij de maaltijd. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 298 | ANTI-ARITMICA K1/3 | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 299 | THYREOMIMETICA | OESTROGENEN | Werkzaamheid thyreomimeticum kan verminderen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Werkzaamheid thyreomimeticum kan verminderen. Controleer schildklierfunctie. Zie commentaar. | ASS | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 300 | THYREOMIMETICA | ENZYMINDUCTOREN | Werkzaamheid thyreomimeticum kan verminderen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Werkzaamheid thyreomimeticum kan verminderen. Controleer schildklierfunctie. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 301 | STATINES | AMIODARON | Niet afleveren. Kans op ernstige spierpijn. Kies alternatief voor ator-/simvastatine. Overleg met apo. | Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Vervang ator-/simvastatine door alternatief. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 302 | BOSENTAN | GLIBENCLAMIDE | Niet afleveren. Verhoogde kans op leverschade. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op leverschade. Geef alternatief voor glibenclamide. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 303 | BOSENTAN | CYP3A4-REMMERS | Niet afleveren. Verhoogde kans op leverschade en afname effect keto-/voriconazol. Overleg met apo. | Verhoogde kans op leverschade en afname effect keto-/ voriconazol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 304 | NSAID'S | ACETYSALICYLZUUR | Verhoogd risico maagbloeding. Overleg met apotheker. | Verhoogd risico maagbloeding. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 309 | SSRI'S/SNRI'S | THIAZIDE-DIURETICA | Verhoogd risico op hyponatriemie. Overleg met apotheker; informeer arts en patient. | Verhoogd risico op hyponatriemie. Controleer natriumspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 310 | BRIVUDINE | (PRODRUG)-5-FU | Niet afleveren. Kans op fluorouracil-intoxicatie. Overleg met apotheker. | Vermijd deze combinatie. Kans op fluorouracil-intoxicatie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 311 | CARBAPENEMS | VALPROINEZUUR | Kans op verminderd effect natriumvalproaat. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op verminderd effect natriumvalproaat. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 313 | RIFABUTINE | AZOLANTIMYCOTICA | Niet afleveren. Stijging rifabutinespiegel, antimycoticum onwerkzaam. Overleg met apotheker. | Vermijd combinatie. Stijging rifabutinespiegel, antimycoticum onwerkzaam. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|---|-----|--------|--------|----|
| 314 | PROTEINEKINASE-REM | ANTACIDA/CARBONAAT | Adviseer patient om antacidum/carbonaat min. 2 uur voor of 2 uur na proteïnekinase-remmer in te nemen. | Adviseer patient om antacidum/carbonaat min. 2 uur voor of 2 uur na proteïnekinase-remmer in te nemen. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 315 | PROTEINEKINASE-REM | ZUURSECRETIEREMMER | Overleg met apotheker. Opname van proteïnekinase-remmer kan worden verminderd. Zie commentaar. | Resorptie van proteïnekinase-remmer kan worden verminderd. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 316 | CICLOSPORINE | SOMATOSTAT.ANALOGA | Kans op verlaagde ciclosporinespiegel. Overleg met apotheker. | Kans op verlaagde ciclosporinespiegel. Controleer spiegel. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 318 | PIMOZIDE | SSRI'S | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Zie commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 319 | THEOFYLLINE | MEXILETINE | Kans op toxiciteit theofylline. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op toxiciteit theofylline. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 320 | MYCOFENOLZUUR | CICLOSPORINE | Kans op therapiefalen mycofenolzuur. Overleg met transplantatie-arts. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Kans op therapiefalen mycofenolzuur. Overleg met transplantatie-arts. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 321 | MYCOFENOLZUUR | ENZYMINDUCTOREN | Kans op therapiefalen mycofenolzuur. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op therapiefalen mycofenolzuur. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 323 | ETHINYLESTRADIOL | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderde werking ethinylestradiol. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verminderde werking ethinylestradiol. Zie commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 324 | VKA's | PIROXICAM | Niet afleveren: sterk verhoogd bloedingsrisico. Zie commentaren medicatiebewaking. | Sterk verhoogd bloedingsrisico. Geef ander NSAID/paracetamol. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 325 | ERLOTINIB | CYP1A2-REMMERS | Kans op verhoogde toxiciteit van erlotinib; overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op verhoogde toxiciteit van erlotinib; eventueel dosis verlagen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 326 | THEOFYLLINE | ANTICONCEPTIVA | Kans op theofyllinetoxiciteit. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op theofyllinetoxiciteit. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 327 | TACROLIMUS | SEVELAMEER | Kans op therapiefalen tacrolimus. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op therapiefalen tacrolimus. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 328 | RIFABUTINE | MACROLIDEN | Stijging rifabutinespiegel, macrolide minder werkzaam. Overleg met apotheker. | Raadpleeg commentaar. Stijging rifabutinespiegel, macrolide minder werkzaam. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 329 | CLARI/ERYTROMYCINE | RIFAMP/RIFAMYCINE | Niet afleveren. Therapiefalen macrolide-antibioticum. Overleg met apotheker. | Raadpleeg commentaar. Vermijd combinatie. Therapiefalen macrolide-antibioticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 330 | MORFINOMIMETICA | CYP3A4-REMMERS | Kans op toename bijwerkingen morfinomimeticum. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op toxiciteit van morfinomimeticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 331 | STATINES | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd therapeutisch effect statine. Niet afleveren. Overleg met apo. | Kans op verminderd therapeutisch effect statine. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 332 | TAMOXIFEN | CYP2D6-REMMER | Kans op verminderde effectiviteit tamoxifen. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker. | Kans op verminderde effectiviteit tamoxifen. Vermijd zo mogelijk CYP2D6-remmer. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 333 | BUDESONIDE | CYP3A4-REMMER | Bij langdurig gebruik CYP3A4-remmer: kans op systemische bijwerkingen budesonide. Raadpleeg apotheker. | Bij langdurig gebruik CYP3A4-remmer: kans op systemische bijwerkingen budesonide. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|--|-----|--------|--------|----|
| 334 | IVABRADINE | CYP3A4-REMMER | Verhoogde kans op (ernstige) bradycardie. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op (ernstige) bradycardie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 335 | IVABRADINE | ENZYMINDUCTOREN | Kans op spiegeldaling ivabradine en verminderd effect. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op spiegeldaling ivabradine en verminderd effect. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 336 | STATINES | FUSIDINEZUUR | Kans op ernstige spierpijn/zwakte. Vervang fusidinezuur of adviseer stoppen statine tijdens kuur. | Kans op myopathie en rbdomyolyse. Vervang fusidinezuur of adviseer stoppen statine tijdens kuur. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 337 | ANTIDIABETICA | BETABLOKKERS (SEL) | Informeert patient over mogelijk veranderde voortekenen van hypoglykemie. | Informeert patient over mogelijk veranderde voortekenen van hypoglykemie. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 338 | DABIGATRAN | PGP-REMMERS | Niet afleveren. Kans op verhoogde dabigatranspiegel. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Kans op verhoogde dabigatranspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 339 | ANTIPSYCHOTICA | CYP2D6-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel antipsychoticum. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op stijging plasmaspiegel antipsychoticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 340 | HALOPERIDOL | CYP2D6-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel haloperidol. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op stijging plasmaspiegel haloperidol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 341 | CLOZAPINE | CYP1A2 - REMMERS | Niet afleveren. Kans op verhoogde clozapinespiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verhoogde clozapinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 342 | CLOZAPINE | SSRI's | Niet afleveren. Kans op verhoogde clozapinespiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verhoogde clozapinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 343 | LITHIUM | METHYLDOPA | Risico op lithium-intoxicatie. Controle lithiumspiegel is nodig evt dosis aanpassen. Overleg met apo. | Risico op lithium-intoxicatie. Controle lithiumspiegel is nodig evt dosis aanpassen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 6 mnd | Ja |
| 344 | STIRIPENTOL | ANTI-EPILEPTICA | Verhoogde spiegel carbamazepine/ fenobarbital/ fenytoïne. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verhoogde spiegel carbamazepine/ fenobarbital/ fenytoïne. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 345 | ANTIMICROBIEEL GNM | BIOLOGICALS | Overleg met voorschrijvers of gebruik biological tijdens infectie gestaakt moet worden. | Overweeg i.o.m. voorschrijver biological of gebruik tijdens infectie gestaakt moet worden. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 346 | DEFERASIROX | ENZYMINDUCTOREN | Kans op spiegeldaling deferasirox en verminderd effect. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op spiegeldaling deferasirox en verminderd effect. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 347 | PDE-5-REMMERS | ALFA-BLOKKERS | Kans op daling bloeddruk. Start met zo laag mogelijke dosering. Informeert patient. | Kans op daling bloeddruk. Start met zo laag mogelijke dosering. Informeert patient. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 349 | CLOPIDOGREL | (ES)OMEPRAZOL | Verminderd effect clopidogrel. Vermijd (es)omeprazol. Overleg met apotheker. | Verminderd effect clopidogrel. Vermijd (es)omeprazol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 350 | CICLOSPORINE | GALZUURBIND. HARS | Kans op spiegelverlaging ciclosporine en therapiefalen. Niet afleveren. Overleg met apo. | Kans op verlaging spiegel ciclosporine en therapiefalen. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------|---|--|-----|--------|--------|----|
| 351 | VKA's | (ES)OMEPRAZOL | Bij eerste uitgifte (es)omeprazol: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start (es)omeprazol: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 352 | VKA's | ONCOLYTICA | Bij eerste uitgifte oncolyticum: gewijz. antistolling: informeer TD! MTX bij reuma/psoriasis: geen actie. | Bij start oncolyticum: gewijzigde antistolling. MTX bij reuma/psoriasis: geen actie. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 353 | DOPAMINE-AGONISTEN | CYP3A4-REMMERS | Niet afleveren. Kans op ernstige bijwerkingen. Vervang een van beide middelen door alternatief. | Kans op ernstige bijwerkingen. Vervang een van beide middelen door alternatief. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 354 | AGOMELATINE | CYP1A2-REMMERS | Niet afleveren. Kans op toename bijwerkingen agomelatine. Overleg met apotheker. Zie comm. | Kans op toename bijwerkingen agomelatine. Vervang een van beide middelen door alternatief. Zie comm. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 355 | LEFLUN./TERIFLUN. | GALZUURBIND. HARS | Kans op onwerkzaamheid leflunomide/teriflunomide. Overleg met apotheker. Zie comm. | Kans op onwerkzaamheid leflunomide/teriflunomide. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 356 | P2Y12-REMMERS | NSAID'S | Verhoogd risico maagbloeding. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Verhoogd risico maagbloeding. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 357 | KALIUMVERBINDINGEN | KALIUMBINDERS | Niet afleveren. Middelen met een tegengestelde werking. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Middelen met een tegengestelde werking. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 358 | ANTRACYCLINES | CICLOSPORINE | Kans op toename antracyclinespiegel en beenmergtoxiciteit. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op toename antracyclinespiegel en myelotoxiciteit; evt antracycline- dosis aanpassen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 359 | CARMUSTINE | CIMETIDINE | Niet afleveren. Verhoogde kans op tox. carmustine. Vervang cimetidine door alternatief. Overleg met apo. | Verhoogde kans op toxiciteit carmustine. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 360 | ETOPOSIDE | CICLOSPORINE | Verhoogde kans op toxiciteit van etoposide. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde kans op toxiciteit van etoposide; eventueel dosis etoposide aanpassen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 361 | (PRODRUG)-5-FU | METRONIDAZOL | Niet afleveren. Kans op fluorouracil-intoxicatie. Overleg met apotheker. | Vermijd deze combinatie. Kans op toxiciteit fluorouracil; evt dosis aanpassen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 362 | IRINOTECAN | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op toxiciteit irinotecan. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde kans op toxiciteit irinotecan. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 363 | IRINOTECAN | ENZYMINDUCTOREN | Verminderd therapeutisch effect irinotecan. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verminderd therapeutisch effect irinotecan. Evt. dosis aanpassen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 364 | MITOTAAN | SPIRONOLACTON | Kans op verminderd effect van mitotaan; overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op verminderd effect van mitotaan; raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 365 | VINCA-ALKALOIDEN | CYP3A4-REMMERS | Niet afleveren. Kans op verhoogde toxiciteit van oncolyticum; overleg met apotheker. | Kans op toxiciteit van oncolyticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 366 | ANTI-EPILEPTICA | ONCOLYTICA | Kans op verminderd effect van het oncolyticum en van het anti- epilepticum; overleg met apo/zie CM. | Kans op verminderd effect van het oncolyticum en het anti-epilepticum; raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|--|---|-----|--------|--------|----|
| 367 | FENYTOINE | ONCOLYTICA | Kans op verminderd effect van fenytoïne; overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verminderd effect van fenytoïne; eventueel dosis fenytoïne aanpassen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 368 | CARBAMAZEPINE | ONCOLYTICA | Kans op verminderd effect van carbamazepine; overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verminderd effect van carbamazepine; evt. dosis carbamazepine aanpassen. Zie comm. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 369 | VALPROINEZUUR | ONCOLYTICA | Kans op verminderd effect van valproïnezuur; overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verminderd effect van valproïne; eventueel dosis valproïne aanpassen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 370 | COLCHICINE | STATINES | Niet afleveren. Verhoogde kans op ernstige spierpijn en spierzwakte. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige myopathie en rhabdomyolyse. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 371 | (PRODRUG)-5-FU | (PEG) INTERFERONEN | Toxiciteit (pro-drug) van fluoro- uracil neemt toe. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Toxiciteit (pro-drug) van fluoro- uracil neemt toe. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 372 | THEOFYLLINE | (PEG) INTERFERONEN | Niet afleveren. Verhoogde kans op toxiciteit theofylline. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verhoogde kans op toxiciteit theofylline. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 373 | TETRABENAZINE | CYP2D6-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel tetrabenzazine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie comm. | Kans op stijging plasmaspiegel tetrabenzazine. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 374 | IJZERCHELATOREN | ASCORBINEZUUR | Kans op afname hartfunctie. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op afname linkerventrikel- functie bij C >200mg per dag. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 375 | CINACALCET | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde spiegel cinacalcet. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verhoogde spiegel cinacalcet. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 376 | TOPIRAMAAT | ENZYMINDUCTOREN | Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel topiramaat. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verlaagde plasmaspiegel topiramaat. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 377 | DIGOXINE | (HYDRO)CHLOROQUINE | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 378 | DIGOXINE | PENICILL./SULFASAL | Verminderde werking digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verminderde werking digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 379 | AMBRISENTAN | CICLOSPORINE | De dagdosering van ambrisentan mag niet hoger zijn dan 5 mg. Overleg met apotheker. | Ambrisentan niet hoger dan 5 mg per dag voorschrijven. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 380 | PDE-5-REMMERS | CYP3A4-REMMERS | Niet afleveren. Verhoogde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Overleg met apotheker. | Verhoogde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 381 | PDE-5-REMMERS | ENZYMINDUCTOREN | Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verlaagde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 382 | BOSENTAN | PDE-5-REMMERS | Verlaagde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Overleg met apotheker. | Verlaagde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|--|-----|--------|--------|----|
| 383 | BOSENTAN | ENZYMINDUCTOREN | Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel bosentan. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verlaagde plasmaspiegel bosentan. Zie commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 384 | COLCHICINE | CICLOSPORINE | Verhoogde kans op ernstige spierpijn of spierzwakte. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verhoogde kans op spiertoxiciteit (myopathie, rhabdomyolyse). Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 385 | ALISKIREN | PGP-REMMERS | Kans op sterke bloeddrukdaling door stijging aliskirenspiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op sterke bloeddrukdaling door stijging aliskirenspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 386 | CASPOFUNGINE | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verlaagde caspofunginespiegel en therapiefalen. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verlaagde caspofunginespiegel en therapiefalen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 387 | CARBAMAZ/OXCARBAZE | DIURETICA | Verhoogd risico op hyponatriemie. Overleg met apotheker; informeer arts en patient. | Verhoogd risico op hyponatriemie. Controleer natriumspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 388 | VKA's | LEFLU./TERIFLUNOM. | Bij eerste uitgifte leflunomide: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start leflunomide: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 389 | ZONISAMIDE | ENZYMINDUCTOREN | Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel zonisamide. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Verlaagde plasmaspiegel zonisamide. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 390 | ELTROMBOPAG | COMPLEX. VERBIND. | Verminderde opname eltrombopag. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verminderde opname eltrombopag. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 391 | THYREOMIMETICA | SEVELAMEER | Thyreomimeticum 1 uur voor of 4 uur na sevelameer innemen. Raadpleeg commentaar. | Absorptie thyreomimeticum kan afnemen. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 392 | TICAGRELOR | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde ticagrelorspiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde ticagrelorspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 393 | TICAGRELOR | ENZYMINDUCTOREN | Niet afleveren. Kans op verminderd effect ticagrelor. Overleg met apotheker. Zie comm. | Kans op verminderd effect ticagrelor. Vervang een van beide middelen door alternatief. Zie comm. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 394 | TICAGRELOR | SIMVASTATINE | Kans op ernstige spierpijn/zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Pas evt. dosering aan. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 395 | PROTEASOOMREMMERS | ENZYMINDUCTOREN | Verminderd therapeutisch effect proteasoomremmer. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verminderd therapeutisch effect proteasoomremmer. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 396 | MEBENDAZOL | METRONIDAZOL | Niet afleveren. Verhoogd risico op ernstige huiduitslag. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verhoogd risico op ernstige huiduitslag (sjs/ten). Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 397 | VKA's | METFORMINE | Bij eerste uitgifte metformine: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start metformine: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 398 | LOVA./SIMVASTATINE | DANAZOL | Kans op ernstige spierpijn/zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 399 | DIGOXINE | TICAGRELOR/MIRABEG | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Zie commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------------------|--|---|-----|--------|--------|----|
| 400 | RUFINAMIDE | VALPROINEZUUR | Kans op stijging plasmaspiegel rufinamide. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Kans op stijging plasmaspiegel rufinamide. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 401 | BLEOMYCINE | ZUURSTOF | Verhoogde kans op longtoxiciteit. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op longtoxiciteit. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 402 | TRIMETHOPRIM | K.SP.AR.DIUR./K/RAS | Verhoogde kans op ernstige hyperkaliemie. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige hyperkaliemie. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 403 | LITHIUM | LISDIURETICA | Risico op lithiumintoxicatie. Controle van lithiumspiegel nodig. Overleg met apotheker. | Risico op lithiumintoxicatie. Controle van lithiumspiegel nodig. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 6 mnd | Ja |
| 404 | ATOMOXETINE | CYP2D6-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel atomoxetine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie comm. | Kans op stijging plasmaspiegel atomoxetine. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 405 | TAXANEN | CYP3A4-REMMERS | Kans op verhoogde spiegel docetaxel/ cabazitaxel en daarmee toxiciteit. Overleg met apotheker. | Kans op verhoogde spiegel docetaxel/ cabazitaxel en daarmee toxiciteit. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 406 | VKA's | PROTEINEKINASEREM. | Bij eerste uitgifte proteïnekinasere- mmer: gewijzigde antistolling. Informeert TD. Zie commentaar. | Bij start proteïnekinasere- mmer: gewijzigde antistolling. Raadpleeg commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 407 | QT-VERL. ANTIBIOT. | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 408 | DOMPERIDON | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 409 | (ES)CITALOPRAM | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 410 | METHADON | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 411 | CHLOROQUINE | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 412 | PENTAMIDINE | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 413 | SEVOFLURAAN | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 414 | TAMOXIFEN | ENZYMINDUCTOREN | Niet afleveren. Verlaagde plasma- spiegel tamoxifen en metaboliet. Overleg met apo. Zie commentaar. | Verlaagde plasmaspiegel tamoxifen en metaboliet. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 415 | RIBAVIRINE | AZATHIOP/MERCAPTOP | Verhoogde kans op toxiciteit azathioprine/mercaptopurine. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde kans op toxiciteit azathioprine/mercaptopurine. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 417 | APIXA-/RIVAROXABAN | CYP3A4/Pgp-REMMERS | Niet afleveren. Verhoogde kans op bloedingen, stijging spiegel anti- | Verhoogde kans op bloedingen, stijging spiegel anti-coagulans. Raadpleeg | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|--|-----|--------|--------|----|
| | | | coagulans. Raadpleeg apo/commentaar. | commentaar. | | | | |
| 418 | APIXA./RIVAROXABAN | ENZYMINDUCTOREN | Niet afleveren. Kans op daling DOAC-spiegel en afname effect. Raadpleeg apo/commentaar. | Kans op daling DOAC-spiegel en afname effect. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 419 | CORTICOSTEROIDEN | SALICYL./COX-2-REM | Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts. | Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 420 | SALICYL./COX-2-REM | SSRIs/SNRIs | Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts. | Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 421 | P2Y12-REMMERS | SALICYL./COX-2-REM | Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts. | Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 422 | NSAIDs | SPIRONOLACTON | Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts. | Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 423 | SALICYL./COX-2-REM | SPIRONOLACTON | Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts. | Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 424 | ONDANSETRON | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 425 | NSAIDs | DOAC's | Verhoogde kans op bloedingen. Overleg met apotheker of arts. Raadpleeg commentaren. | Verhoogde kans op bloedingen. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 426 | SALICYL./COX-2-REM | DOAC'S | Verhoogde kans op bloedingen. Overleg met apotheker of arts. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde kans op bloedingen. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 427 | BORTEZOMIB | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op toxiciteit bortezomib. Overleg met arts of apotheker. | Verhoogde kans op toxiciteit bortezomib. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 428 | EBASTINE | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect ebastine. Vervang ebastine door ander anti-histaminicum. Zie commentaar. | Kans op verminderd effect ebastine. Kies ander anti-histaminicum. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 429 | DOPAMIN. MIDDELEN | ANTI-EMETICA | Kans op verminderd effect (fos)levodopa/ da-agonist. Vervang door ander anti-emeticum. Zie comm. | Kans op verminderd effect (fos)levodopa/da-agonist. Vervang door ander anti-emeticum. Zie comm. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 430 | PIRFENIDON | CYP1A2-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel pifrenidon en bijwerkingen. Overleg met apo. Raadpleeg commentaar. | Kans op stijging plasmaspiegel pifrenidon en bijwerkingen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 431 | LOMITAPIDE | CYP3A4-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel lomitapide en toename bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaar. | Kans op stijging plasmaspiegel lomitapide en toename bijwerkingen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 432 | SIMVASTATINE | LOMITAPIDE | Kans op ernstige spierpijn/zwakte bij simvastatine hoger dan 40 mg per dag. Overleg met apo. Zie commentaar | Verhoogde kans op myopathie en rhabdomyolyse bij simvastatine hoger dan 40 mg per dag. Zie commentaar. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 433 | VKA's | LOMITAPIDE | Bij EU lomitapide: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start lomitapide: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 434 | MEFLOQUINE | ENZYM/PGP-INDUCT. | Kans op daling plasmaspiegel mefloquine en therapiefalen. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op daling plasmaspiegel mefloquine en therapiefalen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|--|-----|--------|--------|----|
| 435 | ENZALUTAMIDE | CYP2C8-REMMERS | Kans op stijging enzalutamidespiegel en toename bijwerkingen. Overleg met arts of apotheker. Zie commentaar. | Kans op stijging enzalutamidespiegel en daarmee toename bijwerkingen. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 436 | (ES)OMEPRAZOL | ENZYMINDUCTOREN | Kans op daling plasmaspiegel (es)omeprazol. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op daling plasmaspiegel (es)omeprazol. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 437 | ABIRATERON | ENZYMINDUCTOREN | Kans op daling plasmaspiegel abirateron. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op daling plasmaspiegel abirateron. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 438 | DIGOXINE | PROTEINEKINASEREM. | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 439 | VKA's | NOSCAPINE | Gewijzigde antistolling. Heroverweeg noodzaak noscapine. Bij handhaven: informeer TD. Zie commentaar. | Gewijzigde antistolling. Heroverweeg noodzaak noscapine. Zie commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 440 | NATRIUMOXYBAAT | VALPROINEZUUR | Kans op spiegelstijging natriumoxybaat. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op spiegelstijging natriumoxybaat. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 441 | FLUCONAZOL | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 442 | PROPOFOL | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 443 | LEFL/TERIFLUNOMIDE | ROSUVASTATINE | Kans op ernstige spierpijn/zwakte bij rosuvastatine hoger dan 10mg/dag Overleg met apo. Zie commentaar. | Kans op ernstige spierpijn/zwakte bij rosuvastatine hoger dan 10mg/dag Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 444 | LURASIDON | CYP3A4-REMMERS | Kans op toename bijwerkingen lurasidon door spiegelstijging. Overleg met apotheker. Zie comm. | Kans op toename bijwerkingen lurasidon door spiegelstijging. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 445 | DABRAFENIB | GEMFIBROZIL | Kans op verhoogde spiegel en toxiciteit dabrafenib. Vervang gemfibrozil door alternatief. | Kans op verhoogde spiegel en toxiciteit dabrafenib. Vervang gemfibrozil door alternatief. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 446 | BEDAQUILINE | ENZYMINDUCTOREN | Verminderde werking bedaquiline door daling bedaquilinespiegel. Niet afleveren. Overleg apotheker. | Verminderde werking bedaquiline door daling bedaquilinespiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 447 | PERAMPANEL | ENZYMINDUCTOREN | Kans op daling plasmaspiegel perampanel. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op daling plasmaspiegel perampanel. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 448 | IDELALISIB | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect idelalisib. Vervang een van beide middelen door alternatief. | Kans op verminderd effect idelalisib. Vervang een van beide middelen door alternatief. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 449 | DONEPEZIL | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 450 | CARBO-/CISPLATINE | AMFO. B/ AMINOGLY. | Kans op versterkte nefrotoxiciteit. Overweeg vervanging antibioticum. Raadpleeg commentaar. | Kans op versterkte nefrotoxiciteit. Overweeg vervanging antibioticum. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|--|-----|-------|--------|----|
| 451 | IMMUNOSUPPRESSIVA | DODE/INACT VACCINS | Kans op verminderd effect vaccin. Niet afleveren. Overleg met apo. | Kans op verminderd effect vaccin. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 452 | VORTIOXETINE | CYP2D6-REMMERS | Stijging vortioxetinespiegel, waardoor kans op bijwerkingen toeneemt. Overleg apo. Zie CM. | Stijging vortioxetinespiegel, waardoor kans op bijwerkingen toeneemt. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 453 | DEFERASIROX | GALZUURBIND. HARS | De plasmaspiegel van deferasirox kan afnemen. Overweeg vervanging van 1 van beide middelen. Zie commentaren. | De plasmaspiegel van deferasirox kan afnemen. Overweeg vervanging van 1 van beide middelen. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 454 | STATINES | IDELALISIB | Kans op ernstige spierpijn/-zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaren. | Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 455 | MIDAZOL./TRIAZOLAM | IDELALISIB | Niet afleveren. Kans op verlenging en effect en toename bijwerkingen midazol./triazolam. Zie CM. | Kans op verlenging effect en toename bijwerkingen midazolam/ triazolam. Raadpleeg commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 456 | RIFABUTINE | IDELALISIB | Stijging plasmaspiegel rifabutine, daling van de blootstelling aan idelalisib. | Stijging plasmaspiegel rifabutine, daling van de blootstelling aan idelalisib. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 457 | ARTEMET./LUMEFAN. | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verlaging plasmaspiegel artemether/lumefantrine. Vervang een van beide middelen. Zie CM. | Kans op verlaging plasmaspiegel artemether/lumefantrine. Vervang een van beide middelen. Zie CM. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 458 | MACITENTAN | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderde effect macitentan. Vervang een van beide middelen. Overleg met apo. Zie CM. | Kans op verminderde effect macitentan. Vervang een van beide middelen. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 459 | MTX (HOGE DOSIS) | LEVETIRACETAM | Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat. Vervang levetiracetam. Overleg met apo. Zie commentaren. | Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat. Vervang zo mogelijk levetiracetam. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 460 | MTX (HOGE DOSIS) | PROTONPOMPREMMEER | Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat. Vervang protonpompremmer. Overleg apo. Zie CM. | Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat. Vervang protonpompremmer. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 461 | VANDETANIB | METFORMINE | Kans op toename bijwerkingen door stijging metforminespiegel. Overleg met apo. Zie CM. | Kans op toename bijwerkingen door stijging metforminespiegel. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 462 | RIOCIGUAT | KETOCONAZOL | Kans op bloeddrukdaling door stijging plasmaspiegel van riociguat. Overleg met apo. Zie CM. | Kans op bloeddrukdaling door stijging plasmaspiegel van riociguat. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 463 | RIOCIGUAT | NITR/PDE-5-REMMERS | Niet afleveren. Kans op bloeddrukdaling. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking. | Niet afleveren. Kans op bloeddrukdaling. Overweeg alternatief. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 464 | FENYTOINE | SULTIAM | Niet afleveren. Kans op verhoogde fenytoinespiegel en toename toxiciteit. Overleg met apo. Zie CM. | Niet afleveren. Kans op toename fenytoinespiegel en toxiciteit. Overweeg alternatief. Zie CM. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 465 | METHENAMINE | SULFONAMIDEN | Niet afleveren. Kans op kristalurie. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking. | Niet afleveren. Kans op kristalurie. Kies alternatief. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 466 | VENLAFAXINE | CYP2D6-REMMERS | Kans op stijging venlafaxinespiegel en bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking. | Kans op stijging venlafaxinespiegel en bijwerkingen. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 467 | PAPAVERINE | QT-VERLENGERS | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Kies alternatief. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------------|---|--|-----|--------|--------|----|
| | | | Overleg met apo. Zie CM. | Raadpleeg commentaar. | | | | |
| 468 | AZOLANTIMYCOTICA | PROTONPOMPREMMERS | Kans op verminderd effect azoolantimycotica. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking. | Kans op verminderd effect azoolantimycotica. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 469 | AMIODARON | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect amiodaron. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op verminderd effect amiodaron. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 470 | VKA's | ACALA/IBRUTINIB | Bij eerste uitgifte acala/ibrutinib: mogelijk verhoogd risico op bloedingen. Informeer TD. Zie CM. | Bij eerste uitgifte acala/ibrutinib: mogelijk verhoogd risico op bloedingen. Zie CM. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 471 | ENZYMINDUCTOREN | NOODANTICONCEPTIE | Noodanticonceptie is minder betrouwbaar; overleg met apotheker. Voorkeur morning-after spiraal. | Noodanticonceptie is minder betrouwbaar; raadpleeg commentaar. Voorkeur morning-after spiraal. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 472 | ELEXA/IVA/TEZACAFT | CYP3A4-REMMERS | Kans op stijging spiegel ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor en toename bijwerkingen. Zie CM. | Kans op stijging spiegel ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor en toename bijwerkingen. Zie CM. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 473 | IVACAFTOR | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd therapeutisch effect van ivacaftor; overleg met apotheker. Zie commentaren. | Kans op verminderd therapeutisch effect van ivacaftor; zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 474 | VKA's | CORTICOSTEROIDEN | Bij eerste uitgifte corticosteroid: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar. | Bij start corticosteroid: mogelijk gewijzigde antistolling. Zie commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 475 | IVACAFTOR+LUMACAFT | CYP3A4-REMMERS | Kans op spiegelstijging ivacaftor en spiegelvaling azoolantimycotica. Overleg met apo. Zie CM. | Kans op spiegelstijging ivacaftor en spiegelvaling azoolantimycotica. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 476 | LITHIUM | TOPIRAMAAT | Lithiumspiegel kan dalen of stijgen. Controle lithiumspiegel is nodig evt dosis aanpassen. Overleg met apo. | Lithiumspiegel kan dalen of stijgen. controle lithiumspiegel is nodig evt dosis aanpassen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 6 mnd | Ja |
| 477 | CIPROFLOX/NORFLOX | CALCIUMVERBINDING | Resorptie ciprofloxacine of norfloxacine kan afnemen. Overleg met apotheker. | Resorptie ciprofloxacine of norfloxacine kan afnemen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 478 | IJZER MGA | DIVERSE MIDDELEN | Verminderde resorptie gnm. Vervang door ijzer zonder geregleerde afgifte. | Verminderde resorptie gnm. Vervang door ijzer zonder geregleerde afgifte. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 479 | TRIMETHOPRIM | FOLINEZUUR | Kans op verminderd therapeutisch effect van trimethoprim. Overleg met apotheker. Zie commentaren. | Kans op verminderd therapeutisch effect van trimethoprim. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 480 | ARIPIRAZOL/BREXPI | CYP3A4-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel aripirazol/brexpiprazol. Overleg met apotheker. Zie commentaren. | Kans op stijging plasmaspiegel aripirazol/brexpiprazol. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 481 | PANOBINOSTAT | CYP3A4-REMMERS | Kans op toxiciteit panobinostat. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Kans op toxiciteit panobinostat. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 482 | OMEPRAZOL | CLOZAPINE | Kans op verminderd therapeutisch effect van clozapine. Overleg met apotheker. Zie commentaren. | Kans op verminderd therapeutisch effect van clozapine. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 483 | DIGOXINE | COLESTYRAMINE | Digoxinespiegel kan dalen. Digoxine ten minste 2 uur voor colestyramine innemen. Zie comm. | Digoxinespiegel kan dalen. Digoxine ten minste 2 uur voor colestyramine innemen. Zie comm. | APO | 24 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--|--|-----|--------|--------|----|
| 484 | GUANFACINE | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect guanfacine controleer klinisch beeld en pas zn dosering aan. Overleg met apo. Zie CM | Kans op verminderd effect guanfacine controleer klinisch beeld en pas zn dosering aan. Zie commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 485 | GUANFACINE | CYP3A4-REMMERS | Kans op toxiciteit guanfacine. Start met lagere dosis en pas zn dosis aan op geleide v effect. Overleg met apo | Kans op toxiciteit guanfacine. Start met lagere dosis en pas zn dosis aan op geleide v effect. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 486 | DILTIAZ./VERAPAMIL | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect diltiazem/ verapamil. Overleg met apo. Zie commentaren. | Kans op verminderd effect diltiazem/ verapamil. Zie commentaren. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 487 | DILTIAZ./VERAPAMIL | CARBAMAZ./FENYTOIN | Kans op verminderd effect calcium-antagonist. Kans op toxiciteit anti-epilepticum. Overleg met apo. Zie CM | Kans op verminderd effect calcium-antagonist. Kans op toxiciteit anti-epilepticum. Zie commentaren. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 488 | GLIBENCLAMIDE | RIFAMPICINE | Niet afleveren. Verhoogde kans op hypoglykemie. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren. | Verhoogde kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 489 | (DES)FESOTERODINE | ENZYMINDUCTOREN | Kans op afname werkzaamheid (des)fesoterodine. Overleg met apo. Raadpleeg commentaren. | Kans op afname werkzaamheid (des)fesoterodine. Raadpleeg commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 490 | ULIPRISTAL | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect ulipristal. Vervang een van beide middelen. Overleg met apo. Zie CM. | Kans op verminderd effect ulipristal. Vervang een van beide middelen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 492 | THYREOMIMETICA | PATIROMER/POLYSTYR | Kans op hypothyreoïdie. Patiromer of polystyreensulfonzuur 3 uur na thyreomimeticum innemen. Zie CM. | Kans op hypothyreoïdie. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 493 | NALOXEGOL | CYP3A4-REMMERS | Kans op verhoogde spiegels naloxegol en daarmee toename bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaar. | Kans op verhoogde spiegels naloxegol en daarmee toename bijwerkingen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 494 | CARBAMAZEPINE | FENOBARB./PRIMIDON | Verminderde werking carbamazepine, fenobarb. en primidon door verlaging plasmaspiegel. Raadpleeg apotheker. | Verminderde werking carbamazepine, fenobarb. en primidon door verlaging plasmaspiegel. Raadpleeg commentaar. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 495 | VORICONAZOL | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect voriconazol, carbamaz. en fenytoine. Overleg met apo. Zie commentaar. | Kans op verminderd effect voriconazol, carbamazepine en fenytoine. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 496 | SELEXIPAG | CYP2C8-REMMERS | Verhoogde kans op toxiciteit selexipag. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren. | Verhoogde kans op toxiciteit selexipag. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 497 | SELEXIPAG | RIFAMPICINE | Kans op verminderd effect selexipag. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Kans op verminderd effect selexipag. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 498 | HYDROXYCHLOROQUINE | QT-VERLENGER | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker. | Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 499 | DAPSON | RIFAMYCINES | Bij lepra: geen actie. Bij overige indicaties: overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren. | Bij lepra: geen actie. Bij overige indicaties: raadpleeg commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 501 | ZIDOVUDINE | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met zidovudine (ZDV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 501. | Interactie met zidovudine (ZDV). Zie commentaar IA 501. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|--|--|-----|-------|--------|----|
| 505 | LAMIVUDINE | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met lamivudine (3TC). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 505. | Interactie met lamivudine (3TC). Zie commentaar IA 505. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 506 | SAQUINAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met saquinavir (SQV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 506. | Interactie met saquinavir (SQV). Zie commentaar IA 506. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 508 | RITONAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met ritonavir (RTV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 508. | Interactie met ritonavir (RTV). Zie commentaar IA 508. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 512 | NEVIRAPINE | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met nevirapine (NVP). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 512. | Interactie met nevirapine (NVP). Zie commentaar IA 512. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 514 | ABACAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met abacavir (ABC). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 514. | Interactie met abacavir (ABC). Zie commentaar IA 514. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 516 | EFAVIRENZ | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met efavirenz (EFV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 516. | Interactie met efavirenz (EFV). Zie commentaar IA 516. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 517 | LOPINAVER+RITONAV. | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met lopinavir+ritonavir (LPV/r). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 517. | Interactie met lopinavir+ritonavir (LPV/r). Zie commentaar IA 517. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 518 | TENOFOVIR DISOPROX | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met tenofovir disoproxil (TDF). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 518. | Interactie met tenofovir disoproxil (TDF). Zie commentaar IA 518. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 519 | ATAZANAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met atazanavir (ATV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 519. | Interactie met atazanavir (ATV). Zie commentaar IA 519. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 520 | FOSAMPRENAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met fosamprenavir (FPV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 520. | Interactie met fosamprenavir (FPV). Zie commentaar IA 520. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 521 | TIPRANAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met tipranavir (TPV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 521. | Interactie met tipranavir (TPV). Zie commentaar IA 521. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 522 | EMTRICITABINE | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met emtricitabine (FTC). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 522. | Interactie met emtricitabine (FTC). Zie commentaar IA 522. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 523 | DARUNAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met darunavir (DRV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 523. | Interactie met darunavir (DRV). Zie commentaar IA 523. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 525 | MARAVIROC | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met maraviroc (MRV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 525. | Interactie met maraviroc (MRV). Zie commentaar IA 525. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 526 | ETRAVIRINE | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met etravirine (ETR). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 526. | Interactie met etravirine (ETR). Zie commentaar IA 526. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 527 | RALTEGRAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met raltegravir (RAL). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 527. | Interactie met raltegravir (RAL). Zie commentaar IA 527. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------------|---|---|-----|-------|--------|----|
| 528 | RILPIVIRINE | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met rilpivirine (RPV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 528. | Interactie met rilpivirine (RPV). Zie commentaar IA 528. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 529 | ELVITEGRAVIR+COBI. | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met elvitegravir+ cobicistat (EVG/c). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 529. | Interactie met elvitegravir +cobicistat (EVG/c). Zie commentaar IA 529. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 530 | COBICISTAT | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met cobicistat (COBI). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 530. | Interactie met cobicistat (COBI). Zie commentaar IA 530. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 531 | DOLUTEGRAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met dolutegravir (DTG). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 531. | Interactie met dolutegravir (DTG). Zie commentaar IA 531. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 532 | TENOFOVIR ALAFENAM | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met tenofovir alafenamide (TAF). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 532. | Interactie met tenofovir alafenamide (TAF). Zie commentaar IA 532. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 533 | BICTEGRAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met bictegravir (BIC). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 533. | Interactie met bictegravir (BIC). Zie commentaar IA 533. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 534 | DORAVIRINE | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met doravirine (DOR). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 534. | Interactie met doravirine (DOR). Zie commentaar IA 534. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 535 | CABOTEGRAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met cabotegravir (CAB). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 535. | Interactie met cabotegravir (CAB). Zie commentaar IA 535. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 536 | FOSTEMSAVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met fostemsavir (FTR). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 536. | Interactie met fostemsavir (FTR). Zie commentaar IA 536. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 604 | SOFOSBUVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met sofosbuvir (SOF). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 604. | Interactie met sofosbuvir (SOF). Zie commentaar IA 604. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 606 | LEDIPASVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met ledipasvir (LDV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 606. | Interactie met ledipasvir (LDV). Zie commentaar IA 606. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 607 | OMBI/PARI/RITONAV | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met ombi/pari/ritonavir (PrO). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 607. | Interactie met ombi/pari/ritonavir (PrO). Raadpleeg commentaar IA 607 of zo nodig specialist. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 608 | VELPATASVIR | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met velpatasvir (VEL). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 608. | Interactie met velpatasvir (VEL). Zie commentaar IA 608. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 609 | GRAZOPREVI/ELBAS. | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met grazoprevir/elbasvir (GE). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 609. | Interactie met grazoprevir/elbasvir (GE). Zie commentaar IA 609. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 610 | GLECAPREVI/PIBRE. | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met glecaprevir/ pibrentasvir (GP). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 610. | Interactie met glecaprevir/ pibrentasvir (GP). Zie commentaar IA 610. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 611 | VOXILAPREVI | OVERIGE MIDDELEN | Interactie met voxilaprevir (VOX). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 611. | Interactie met voxilaprevir (VOX). Zie commentaar IA 611. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|--|--|-----|--------|--------|----|
| 702 | MICONAZOL | CYP3A4-SUBSTRAAT | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 705 | MIZOLASTINE | CYP3A4-REMMERS | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 707 | MORFINOMIMETICA | MAO-REMMERS | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 710 | RIZATRIPTAN | PROPRANOLOL | Interactie volgens fabrikant. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Interactie volgens fabrikant. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 711 | BUPROPION | MAO-REMMERS | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 715 | TACROLIMUS | CICLOSPORINE | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 717 | ATOMOXETINE | MAO-REMMERS | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 718 | DULOXETINE | CYP1A2-REMMERS | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 721 | MAO-REMMERS | TRIPTANEN | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 723 | ANTI-EPILEPTICA | SINT-JANSKRUID | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 724 | DARIFENACINE | CYP3A4/Pgp-REMMERS | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 726 | CABERGOLINE | DOMPERIDON | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 727 | MAO-B-REMMERS | SSRI's | Afgeraden combinatie volgens fabrikant. Klinische relevantie onduidelijk. | Afgeraden combinatie volgens fabrikant. Klinische relevantie onduidelijk. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 729 | ORLISTAT | VKA's | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 730 | BUPRENORFINE | BENZODIAZEPINES | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 731 | CICLOSPORINE | LERCANIDIPINE | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------|---|---|-----|--------|--------|----|
| 732 | TETRABENAZINE | MAO-REMMERS | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 733 | DAPOXETINE | CYP3A4-REMMERS | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 734 | (FOS)LEVODOPA | FENELZ./TRANLYCYP. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar. | Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar. | ASS | 24 mnd | 24 mnd | Ja |
| 800 | FLUCLOXACILLINE | VORICONAZOL | Vervang een van beide middelen door een alternatief. Raadpleeg commentaren. | Vervang een van beide middelen door een alternatief. Raadpleeg commentaren. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 801 | TCA's | VALPROINEZUUR | Kans op verhoogde spiegels TCA en daarmee toename bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaar. | Kans op verhoogde spiegels TCA en daarmee toename bijwerkingen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 802 | VKA's | FLUCLOXACILLINE | Bij eerste uitgifte flucloxacilline: gewijzigde antistolling. Informeer TD. | Bij start flucloxacilline: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 803 | VENETOCLAX | CYP3A4-REMMERS | Kans op stijging plasmaspiegel venetoclax en toename bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaar. | Kans op stijging plasmaspiegel venetoclax en toename bijwerkingen. Raadpleeg commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 804 | VENETOCLAX | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verlaging plasmaspiegel venetoclax. Vervang een van beide middelen. Zie commentaar. | Kans op verlaging plasmaspiegel venetoclax. Vervang een van beide middelen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 805 | MTOR-REMMERS | ACE-REMMERS | Vervang ACE-remmer door angiotensine-II-antagonist. | Vervang ACE-remmer door angiotensine-II-antagonist. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 806 | DABIGATRAN | PGP-INDUCTOREN | Niet afleveren. Kans op daling dabigatranspiegel en afname effect. Raadpleeg apo. Zie commentaar. | Kans op daling dabigatran spiegel en afname effect. Vervang een van beide middelen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 807 | EDOXABAN | PGP-REMMERS | Kans op verhoogde edoxabanspiegel en bloedingsrisico. Raadpleeg apotheker. Zie commentaar | Kans op verhoogde edoxabanspiegel en bloedingsrisico. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 808 | EDOXABAN | PGP-INDUCTOREN | Niet afleveren. Kans op daling edoxabanspiegel en afname effect. Raadpleeg apotheker. Zie commentaar. | Kans op daling edoxabanspiegel en afname effect. Vervang een van beide middelen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 809 | OLAPARIB | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op toxiciteit olaparib. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking. | Verhoogde kans op toxiciteit olaparib. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 810 | CARIPRAZINE | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op bijwerkingen cariprazine. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking. | Verhoogde kans op bijwerkingen cariprazine. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 811 | TOLVAPTAN | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op bijwerkingen tolvaptan. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking. | Verhoogde kans op bijwerkingen tolvaptan. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 812 | TOLVAPTAN | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect tolvaptan. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Kans op verminderd effect tolvaptan. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|---|-----|--------|--------|----|
| 813 | ROSUVASTATINE | REGORAFENIB | Niet afleveren. Verhoogde kans op ernstige spierpijn en spierzwakte. Overleg met apotheker. Zie CM. | Niet afleveren. Verhoogde kans op ernstige spierpijn en spierzwakte. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 814 | DESMOPRESSINE | NSAID'S | Verhoogd risico op hyponatriemie. Overleg met apotheker; informeer arts en patient. Zie commentaar. | Verhoogd risico op hyponatriemie. Controleer natriumspiegel. Raadpleeg commentaren. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 815 | RUXOLITINIB | CYP3A4-REMMERS | Kans op verhoogde toxiciteit van proteïnekinaseremmer. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren. | Kans op verhoogde toxiciteit van proteïnekinaseremmer. Verlaag evt dosis. Raadpleeg commentaren. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 816 | CHINOLONEN | CORTICOSTEROIDEN | Kans op ernstige (achilles)peesklachten. Overleg met apotheker. Zie commentaren. | Kans op ernstige (achilles)peesklachten. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 817 | IMMUNOSUPPRESSIVA | FLUCLOXACILLINE | Verlaging van de bloedspiegel van het immunosuppressivum. Overleg met apotheker. Zie commentaren. | Verlaging van de bloedspiegel van van het immunosuppressivum. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 818 | BARICITINIB | PROBENECIDE | Kans op toename bijwerkingen baricitinib. Overleg met apotheker. Zie commentaren. | Kans op toename bijwerkingen baricitinib. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 819 | AMINOGLYCOSIDEN | ATALUREN | Kans op nefrotoxiciteit. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Kans op nefrotoxiciteit. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 820 | ATALUREN | RIFAMPICINE | Kans op verminderd effect ataluren. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Kans op verminderd effect ataluren. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 821 | CICLOSPORINE | TICAGRELOR | Kans op stijging plasmaspiegel ciclosporine en ticagrelor. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op stijging plasmaspiegel ciclosporine en ticagrelor. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 822 | OLAPARIB | ENZYMINDUCTOREN | Kans op verminderd effect olaparib. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Kans op verminderd effect olaparib. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 823 | SALICYL./COX-2-REM | HEPARINES | Verhoogde kans op maagbloedingen. Overleg met apotheker of arts. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde kans op maagbloedingen. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 824 | NSAIDs | HEPARINES | Verhoogde kans op maagbloedingen. Overleg met apotheker of arts. Raadpleeg commentaar. | Verhoogde kans op maagbloedingen. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 825 | DIGOXINE | IVACAFTOR | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking. | Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking. | APO | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 826 | CICLOSPORINE | (HYDRO)CHLOROQUINE | Kans op stijging plasmaspiegel ciclosporine. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Kans op stijging plasmaspiegel ciclosporine. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 12 mnd | Ja |
| 827 | TOFACITINIB | CYP3A4-REMMERS | Verhoogde kans op bijwerkingen tofacitinib. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking. | Verhoogde kans op bijwerkingen tofacitinib. Zie commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 828 | CANNABIS | RIFAMPICINE | Kans op verlaagde spiegel cannabis. Overleg met voorschrijver. Raadpleeg Commentaren medicatiebewaking. | Kans op verlaagde spiegel cannabis. Raadpleeg Commentaren medicatiebewaking. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|---|--|-----|--------|--------|-----|
| 829 | VKA's | COX-2-REMMERS | Niet afleveren; verhoogd bloedingsrisico. Overleg met apo. Bij hand- haven COX-2-rem>1wk: informeer TD. | Bij start COX-2-remmer: verhoogd bloedingsrisico. Zie Commentaren medicatiebewaking. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 830 | LEVOTHYROXINE | SEMAGLUTIDE ORAAL | Kans op bijwerkingen levothyroxine. Let op controle TSH en innameadvies. Raadpleeg CM. | Kans op bijwerkingen levothyroxine. Let op controle TSH en innameadvies. Raadpleeg CM. | ASS | 12 mnd | 12 mnd | Ja |
| 831 | LETERMOVIR | CICLOSPORINE | Verhoogde kans op bijwerkingen ciclosporine en letermovir. Overleg met voorschrijver. Raadpleeg CM. | Verhoogde kans op bijwerkingen ciclosporine en leterm. ovir. Raadpleeg CM. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 832 | CIPROFLOX/NORFLOX | PATIROMER/POLYSTYR | Resorptie antibioticum kan afnemen. Overleg met apotheker. Zie commentaar. | Resorptie antibioticum kan afnemen. Zie commentaar. | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 833 | LETERMOVIR | ENZYMINDUCTOREN | Verhoogde kans op bijwerkingen letermovir. Overleg met voorschrijver. Raadpleeg CM. | Verhoogde kans op bijwerkingen letermovir. Raadpleeg Commentaren Medicatiebewaking. | ASS | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 834 | RISPERIDON | ITRACON./VERAPAMIL | Kans op stijging plasmaspiegel risperidon/paliperidon. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar. | Kans op stijging plasmaspiegel risperidon/paliperidon. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking | APO | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 835 | CLOPIDOGREL | CYP2C19-REMMERS | Verminderd effect clopidogrel. Overleg met apotheker. | Verminderd effect clopidogrel. Raadpleeg commentaar IA 835. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Ja |
| 836 | SULFONYLUREUMDER. | CLARITROMYCINE | Kans op hypoglykemie; kies zo mogelijk ander anti-microbieel middel. Overleg met APO, zie CM. | Kans op hypoglykemie; kies zo mogelijk ander anti-microbieel middel. Raadpleeg commentaar. | ASS | 0 mnd | 24 mnd | Ja |
| 837 | NIRMATR.+RITONAVIR | ENZYMINDUCTOREN | Kans op therapiefalen nirmatrelvir. Vermijd combinatie. Raadpleeg CM. | Kans op therapiefalen nirmatrelvir. Vermijd combinatie. Raadpleeg CM. | APO | 0 mnd | 0 mnd | Nee |