

Tabel 1.

Geneesmiddel(groepen) met bewaking na de herziening contra-indicatie diabetes mellitus.

Geneesmiddel(groep)	Effect	Advies
Acipimox	Hypoglykemie	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel in de eerste week kan dalen.
Alpelisib	Hyperglykemie	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan stijgen.
Androgenen	Ontregeling bloedglucose	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan ontregelen bij starten/stoppen.
Atypische antipsychotica	Hyperglykemie	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan stijgen.
Disopyramide	Hypoglykemie	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan dalen.
Glucocorticoïden (systemisch)	Hyperglykemie	Instrueer patiënt de bloedglucosespiegel extra te controleren de eerste dagen na starten/stoppen
Gonadoreline-agonisten	Verslechtering diabetescontrole	Bij prostaatacarcinoom: informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan ontregelen. Andere indicaties: geen actie
HIV-proteaseremmers	Hyperglykemie	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan stijgen.
(Hydroxy)chloroquine	Hypoglykemie	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan dalen.
Mecasermine	Hypoglykemie	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan dalen.
Pentamidine	Hypoglykemie	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan ontregelen.
Thyreomimetica en α -statica	Ontregeling bloedglucose	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan ontregelen.
Tyrosinekinaseremmers	Ontregeling bloedglucose	Informeer patiënt dat bloedglucosespiegel kan ontregelen.